



브롬콜[®]액

진해거담제

- * 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보 참조하십시오.
- * 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- * 의약품을 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)에 알려거나 자사로 연락 바랍니다.

브롬콜액은 기관지 β 수용체에 대한 높은 선택성은 물론, histamine, serotonin, acetylcholine 등의 각종 spasmogen(연축유발인자) 및 미주신경자극 등에 의해 유발된 기관지 수축·경련에 대해 우수한 기관지 확장 작용을 발휘하여 호흡기능을 개선시키고, 기도내 분비물을 효과적으로 완화, 제거시켜 기침, 가래, 천식 등의 각종 기관지 질환에 어른은 물론 어린이도 함께 복용할 수 있는 맛좋은 진해·거담제입니다. 뿐만 아니라, 브롬콜 액에는 예로부터 진해효과 및 항균작용으로 기침, 천식, 백일해 등에 널리 응용되어 온 매자나무과(Berberidaceae)의 남천실(Nandinae Fructus, 南天實)도 적절히 배합되어 있어 더욱 효과적입니다.

원료약품 및 그 분량

이 약 100ml중

주성분 : 남천실(南天實) 연조엑스(별첨규격)	1135.42mg
[총 알칼로이드(O-메틸도메스틴)로서 2.8mg]	
트리메토클놀염산염수화물(약전)	12.5mg
구아아쿨실폰산칼륨(약전)	562.5mg
클로르페니라민말레산염(약전)	12.5mg
무수카페인(약전)	145.83mg
첨가제(보존제) : 안식향산나트륨(약전)	100mg

성 상

갈색의 투명한 액으로서 갈색유리병에 담겨져 있는 액제.

효능·효과

기침, 가래, 천식

용법·용량

다음의 1회 용량을 1일 3~4회 식후 및 취침 시에 복용한다.
1일 6회까지 복용가능하며, 복용간격은 4시간으로 한다.

※ 1회복용량

15세 이상 성인	8ml
11세 이상 ~ 15세 미만	5ml
8세 이상 ~ 11세 미만	4ml
5세 이상 ~ 8세 미만	2.5ml
3세 이상 ~ 5세 미만	2ml
2세 이상 ~ 3세 미만	1.5ml

(브롬콜 액에는 계량컵·약 20ml 용기가 동봉되어 있습니다.)

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
- 2) 약으로 알레르기 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 간장애, 신장애, 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열 환자, 허약자
- 4) 심장애 및 고혈압 환자, 고령자
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 6) 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨장애 환자
- 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2. 이상반응

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 이 약을 투여함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

3. 일반적주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여한다.
- 4) 이 약은 안식향산나트륨을 포함하고 있으며, 안식향산은 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있다.

BROMCOL

4. 상호작용

다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등과 병용투여하지 않는다.

5. 소아에 대한 투여

2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 2세 미만의 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관한다.

저장방법(보관방법) 및 사용기한

기밀용기, 실온(1~30℃)보관 / 제조일로부터 36개월

포장단위

자사 포장 단위

교환방법

- 1) 본 제품은 "우수 의약품 제조관리 기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하시기 바랍니다.
- 2) 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 바꾸어 드립니다.
- 3) 본 제품은 재정경제부고시에 의거 소비자의 정당한 피해를 보상해 드립니다.

최신정보 확인 방법

* 본 설명서 문안작성 2008년 6월 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지나 소비자상담 전화를 이용하여 확인할 수 있습니다.

제조사
 **한 국 콜 마**
 충남 연기군 천의면 신창리 619-3

제조의뢰자

태평양제약

본사 : 서울시 용산구 한강로2가 175-2
 헬스케어 사업장 : 경기도 안산시 신건지동 59-6
<http://www.pacificpharm.co.kr>