

콧물, 재채기, 코막힘

지코에스

시럽

지코에스시럽은

비충혈(코막힘)제거제인 수도에페드린염산염과 항히스타민제인 트리프롤리딘염산염수화물이 복합 처방되어 있어 코감기 및 비염(코염)의 증상상 (재채기, 콧물, 코막힘, 눈물, 머리 무거움)에 효과적입니다.

수도에페드린염산염은 강력한 혈관수축작용으로 비충혈(코막힘), 코막힘 해소에 탁월한 효과를 나타내며 트리프롤리딘염산염수화물은 항히스타민제로서 재채기, 콧물, 코막힘을 효과적으로 완화시켜 줍니다.

무색소(Dye-Free)

일반의약품

분류번호

141(항히스타민제)

원료약품의 분량 (100mL 중)

수도에페드린염산염(USP).....	600.0mg
트리프롤리딘염산염수화물(USP).....	25.0mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 (KP).....	60.0mg
파라옥시벤조산프로필 (KP).....	40.0mg

성상

이 약은 딸기향이 있는 무색 내지 옅은 황색의 시럽제입니다.

효능·효과

코감기, 알레르기성 및 혈관운동성 비염(코염)에 의한 다음 증상의 완화:
재채기, 콧물, 코막힘

용법·용량

다음의 1회 용량을 1일 3회 식후에 복용합니다.

연령(나이)	1회 용량
12세 이상 및 성인	10mL
6~12세	5mL
2~5세	2.5mL

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보시고 복용하시기 바랍니다.

1. 다음 환자는 복용하지 마십시오.

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1) 이 약에 과민증 환자 | 2) 중증(심한 증상)의 간 및 신기능 장애 환자 |
| 3) 중증(심한 증상)의 관상 심장 질환 환자 | 4) 잔뇨 형성을 수반하는 배뇨장애 환자 |
| 5) 고혈압 환자 | 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부 |
| 7) 2세 이하의 영아(갓난아기) | 8) MAO 저해제를 투여중인 환자 |
| 9) 파라옥시벤조산메틸에 과민증 환자 | |

2. 다음 환자는 신중히 복용하십시오.

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) 천식환자 | 2) 녹내장 환자 |
| 3) 고혈압 및 관상동맥(심장동맥)질환 환자 | 4) 심질환 및 부정맥 환자 |
| 5) 당뇨병, 갑상선기능항진증 환자 | 6) 전립선비대로 인한 배뇨곤란 환자 |
| 7) 7세 이하의 소아 | |

3. 부작용

- 중추신경계: 진정, 졸음, 중추 신경 쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한(땀이남), 경미한 혈압강하, 시력장애, 산동(동공확대), 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직(굳음), 아테토시스, 간대성 및 강직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비가 나타날 수 있습니다.
- 과민증: 피부반응, 일시적인 자극통, 작열감(화끈감)이 나타날 수 있습니다.
- 소화기계: 구갈(목마름), 구역, 구토가 나타날 수 있습니다.
- 비뇨기계: 배뇨곤란이 나타날 수 있습니다.
- 소아에서 흥분이 나타날 수 있습니다.

지코에스

시럽

4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 투여 중 자동차 운전 및 위험한 기계작업 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 주의하십시오.
- 2) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 연용(계속 복용)전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 7세 이하의 소아에게는 필요한 경우 시럽제를 복용하되 용법·용량을 잘 지키고 표시된 연령(나이) 이외의 소아에게는 투여하지 않습니다.

5. 상호작용

혈압 강하제, 알코올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO저해제, 교감신경흥분제, 삼환계 항우울약, 구아네티딘, 브레틸리움 베타나이드, 데브리소퀸, 메칠도파, 교감신경성약(충혈제거제, 식욕 억제제, 암페타민류의 신경자극제), α 및 β 아드레날린 저해제와 병용투여(함께 복용)하지 않습니다. MAO저해제의 긴 작용시간 때문에 MAO저해제 투여 최소 15일 후 이 약을 투여합니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 안전성이 확립되지 않았으므로 투여하지 않습니다.
- 2) 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않습니다.

7. 소아에 대한 투여

소아에서 특히 부작용이 크게 나타날 수 있으므로 주의합니다.

8. 과량투여시의 처치

과량투여시 급성 중독(환각 및 경련, 신경과민, 어지러움, 불면증 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 방광 카테터 삽입법을 사용합니다. 수도에페드린 제거에는 투석하도록 합니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관합니다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

저장방법

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

90, 500mL

○ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2013년 8월 21일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동 지코에스 시럽은 어린이들이 쉽게 개봉하기 어려운 어린이 보호용 마개(CRC=Child-resistant Closure)를 사용하여 어린이 약물중독을 예방하고 있습니다.

[사용 법]

1. 뚜껑을 누른 상태에서
2. 시계 반대 방향으로 돌려주세요.



제조사:

(주)녹십자

충북 음성군 금왕읍 무극로65번길 26

제조의뢰자:

일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우포로27길 2 (전화) 02-526-3114

공장: 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실: (전화) 080-022-1010 (수신자부담)