임산부빈혈 · 철결핍성빈혈을 위한 철분제

일반의약품
분류번호 322

헤모바이캅셀
hemobycap.
(글루콘산제이철나트륨복염)

헤모바이캅셀은 3가철 복합제로서 철분과의 안정적인 결합을 유지시켜 주는 글루콘산나트륨과 복염(Complex)형태를 이루고 있습니다.
글루콘산제이철 나트륨 복염은 생리활성형 철분의 복염이 Polymer 형태로 구성되어 있어 위장관과의 직접 접촉을 막아 위장장애를 줄이고, 3가철로서 철 이온을 위장관내로 서서히 방출시켜 줌으로써 지속적인 효과를 나타냅니다. 특히 생체 이용률이 탁월한 3가철에 의해 적혈구와 헤모글로빈 수치를 정상화시켜 철분 부족으로 인한 빈혈, 임산부 빈혈 및 각종 빈혈에 뛰어난 치료효과를 나타냅니다.

【원료약품의 분량】
1캅셀중
글루콘산제이철 나트륨 복염(별규) ····· 177.5mg
(철로서 62.5mg)

【성 상】
엷은 갈색의 분말이 충전된 상하 주홍색의 경질캅셀제

【특 장 점】
1. 위내에서 이온화되지 않은 상태로 십이지장에서 흡수되므로 무기철제제의 부작용의 원인인 활성형 철의 생성이 없고 위장장애가 없습니다. 따라서 빈혈환자, 임산부 장기복용시 좋습니다.
2. 비이온성 3가철 복합체로 십이지장에서 철이온이 서서히 유리되고 철이온의 농도를 일정하게 유지하여 지속적인 효과를 나타냅니다.
3. 비이온성 3가철 복합제로 위장관에서 세포흡수작용에 의해 신속히 흡수되어 빠른 효과를 나타내며 글루콘산 나트륨 이온이 철분자를 감싼 형태로 위산이나 효소에 안정하여 철분의 흡수율이 높습니다.
4. 액제나 2가철에 비해 비린맛이 없어서 입덧이 심한 임산부나 어린이에게 좋습니다.

【효능 · 효과】
임산부 빈혈, 철 결핍증, 저색소성 빈혈, 과염소혈증, 출혈성 빈혈, 철 결핍성 빈혈, 전염성 기침 및 단백질, 철분, 비타민 결핍으로 인한 유소년기 빈혈 증후

【용법 · 용량】
성인 : 1회 1캅셀, 1일 2회 식간에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 경고
철 함유 제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약에 과민증이 있는 환자
   2) 혈색소침착증
   3) 헤모시데린 침착증
   4) 용혈성 빈혈
3. 다음 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   1) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
   2) 1세 미만의 유아
   3) 의사의 치료를 받고 있는 사람
4. 복용시에는 다음 사항에 주의하십시오.
   1) 정해진 용법·용량을 지킵니다.
   2) 소아에 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용합니다.
5. 복용중 또는 복용후 다음 사항에 주의하십시오.
   1) 이 약의 복용에 의해 구역, 구토, 식욕부진, 복통, 설사, 변비, 위부불쾌감 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   2) 이 약의 복용에 의해 두드러기, 가려움, 광선과민증 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
   3) 테트라사이클린계 항생제, 클로람페니콜, 제산제, 췌장엑스 및 비타민E와는 상호작용 가능성이 있다고 보고되었으므로 병용투여를 피하는 것이 좋습니다.
   4) 아스코르빈산 (비타민C) 200mg 이상과 동시 복용시 철분의 흡수가 증가될 수 있습니다.
   5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피해야 합니다.
   6) 일정기간 복용하여도 증상이 개선되지 않으면 의사 또는 약사와 상의합니다.
6. 보관상의 주의
   1) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
   2) 직사 일광을 피하고 될 수 있는 대로(습기가 적고)서늘한 곳에(밀전하여)보관합니다.
   3) 오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법 · 사용기한】
기밀용기, 실온(1~30℃)보관
외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

【포장단위】
60캅셀

※ 본 의약품은 KGMP업소에서 제조되어 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

20011018

제조·판매원
한올제약주식회사
서울특별시 광진구 자양 1동 766-15
공장 : 대전광역시 대덕구 상서동 400-1