일반의약품

그래칼®정

GR09001-2002-1

의약품 분류번호	321
	칼슘제

그래칼정은 칼슘소실에 의한 병적인 상태 및 신체에서 칼슘의 필요량이 증가된 경우에 복용함으로써 칼슘부족에 의한 제증상을 개선합니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

탄산칼슘 (USP) 1250mg
(칼슘으로서 500mg)
건조 콜레칼시페롤 (별규) 2mg
(콜레칼시페롤로서 200IU)

【성상】

백색의 장방형 필름코팅정

【작용】

* 약리



(폐경 후 10년이 경과하지 않은 여성들을 대상으로 실시한 임상실험결과)

【효능 · 효과】

1) 칼슘의 결핍 및 기타 칼슘의 보급
2) 다음 경우의 비타민D의 보급
   - 임신, 수유기
   - 발육기
   - 노년기
   - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
     ① 뼈, 이의 발육불량 ② 구루병의 예방

【용법 · 용량】

12세 이상 및 성인 : 1일 2~3회, 1회 1정씩 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
   1) 과칼슘혈증(hypercalciumia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
   2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
   3) 12개월 미만의 영아
   4) 신결석 환자

5) 중증의 신부전 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 (복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
   1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
   2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
   3) 임부, 수유부
   4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
   5) 신장애 환자
   6) 저단백혈증 환자
   7) 강심배당체를 투여중인 환자
3. 부작용
   1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
      : 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
   2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
   3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
   2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 상호작용
   1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
   2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
      : 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
   3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
6. 임부 · 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여
   비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
7. 저장상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오 · 남용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1～30℃)보관　　사용기간: 제조일로부터 30개월

【포장단위】

90정

「변질 · 변패되었거나 사용기간이 경과한 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 직접 교환하여 드립니다.」

♣ 소비자 상담전화 : 080-520-3131　　http://www.samil-pharm.co.kr

〈설명서작성년월일 :2002년 3월〉

제조발매원
samiL 삼일제약 | 주
공장 : 경기도 안산시 원시동 772-1