

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

분류번호: 316 [혼합비타민제(비타민A, D 혼합제를 제외)] **일반의약품**

말초혈행장애 및 갱년기증상완화

엘렉신 연질캡슐

ELLEXIN soft capsules

엘렉신 연질캡슐은 비타민의 보급으로 구내염(입안염), 구순염(입술염), 구각염(입꼬리염), 설염(혀염), 습진, 피부염을 완화시키며 말초혈행장애로 인한 어깨, 목결림이나 수족냉증(손발이 차가움) 등에 효능·효과가 있는 제제입니다.

[원료약품의 분량] 1캡슐 중

추성분 : 리보플라빈부티레이트(KP)	12.0mg
토코페롤아세테이트(KP)	100.0mg
(비타민E로서 100 IU)	
우르소데옥시콜산(KP)	10.0mg
마늘엑스(100→1)(생규)	40.0mg
γ-오리자놀(KP)	10.0mg

첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호

[성상] 황색의 내용물을 함유한 진녹색의 장방형 연질캡슐제

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 E, B₂의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 비타민E(토코페롤아세테이트)
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 비타민B₂(리보플라빈부티레이트)
- 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

[용법·용량] 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (2) 만 3개월 미만의 젖먹이
 - (3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - (4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 2) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - (3) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - (4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 3) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감
 - (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - (4) 우발적으로 과량복용한 경우
 - (5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
 - (6) 이 약은 월경조종자유를 함유하고 있으므로 발진 등의 알레르기 반응과 복통(배아픔)이 나타날 수 있습니다.

4) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- (2) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의하여 복용하십시오.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상감시자에 영향을 줄 수 있습니다.
- (4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고, 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 건냉암소(건조, 시원, 어두운 곳)(1~15℃) 보관

[포장단위] 엘렉신 연질캡슐 90캡슐

[문의전화] 본사 : (02)2021-9300

소비자 상담실 : 080-023-1897(수신자 요금부담)

[제조외지] 동화약품(주)

본사 : 서울특별시 중구 후암로 98, 19층, 공장 : 충청북도 충주시 충주산단1로 167

[제조지] (주)알피코프, 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

※이 첨부문서 작성일자(2015년 9월 21일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.



동화약품

SINCE 1897