골다공증 예방 치료제

에스본정

골다공증이란 40대 후반이후 중년기에 소리없이 찾아오는 질환입니다.무우가 바람이 들어 구멍이 숭숭 뚫려 조금의 힘만 가해주어도 뚝 부러지는 것과 비교될 수 있습니다. 뼈의 조밀도가 떨어짐으로서 뼈의 힘이 약화되어 가벼운 외상에도 골절상을 당하게 됩니다.골다공증은 폐경기 이후의 여성의 1/2 이 발병하며, 난소를 적출한 여성, 사무실 근로자 등에서 발생확률이 높습니다. 유전적인 원인외에 담배를 많이 피우는 사람, 과다한 술을 섭취하는 사람, coffee를 많이 마시는 사람은 칼슘이 손실되어 골다공증에 걸리기 쉽습니다.

에스본정에 함유된 오소판물질은 뉴질랜드의 넓은 초원에서 생리대사가 왕성한 어린 송아지로부터 골유효성분을 추출한 것으로서 종래의 칼슘 보급제나 미내럴 공급제와는 달리 생체내 흡수가 가장 용이한 상태인 생체내 비율(Ca:P=2:1)로 함유되어 있어 생체내 이용율을 극대화 하였고 골조직 대사의 중요 촉매역할을 하는 Amino산과 Collagen 및 Ca, P 뿐만 아니라 미량의 원소를 함유하여 골다공증 예방 및 치료, 골절, 가골형성 지연 또는 임신수유기 여성, 성장기 청소년과 충치의 예방에 많은 효과를 나타냅니다.

[원료약품 및 분량] 1정(310mg)중

오소판 물질 (식약 청고시)	200.0mg
칼슘	42.8mg
인	19.8mg
콜라겐	54.0mg
기타단백	16.0mg
잔류뮤기염류	6.0mg
미량원소 F, Mg, Fe, Zn, Cu, Ni	

[성상] 황색 원형의 필름제피정 입니다.

[효능 • 효과]

1.골다공증
2.골절, 가골형성지연
3.임신, 수유기 및 성장기의 무기질결핍시
4.치아우식증(충치)의 예방

[용법 • 용량] 성인의 평균용량은 1일 3회 1회 1~2정씩 식전복용.

[포장단위] 180, 360정

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관, 36개월

[사용상의 주의사항]

1.다음 사항에 주의하십시오.
  1)정해진 용법 • 용량을 지키십시오.
  2)어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
2.다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
  1)고 칼슘혈증, 중증의 고칼슘뇨증 환자에는 고용량 투여를 금합니다.
  2)이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자는 신중히 투여하십시오.
3.부작용
  이 약의 복용에 의해 때때로 가벼운 변비증상을 가져올 수 있습니다.
4.상호작용
  불화나트륨, 테트라사이클린류 및 그 유도체의 경구투여 3시간 전후에는 이 약을 투여하지 마십시오.

※만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 병 · 의원, 약국 및 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.

제품설명서 작성년월일 2002. 11.15

제조발매원
(주)청계pharma
CHUNG GEI PHARMA.CO.,LTD.
경기도 용인시 구성읍 마북리 382-3