

도미다정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

L-시스테인(JP)	40mg
제피아스코르브산(KPC)	52mg
(아스코르브산으로 50mg)	
판토텐산칼슘(KP)	4.0mg

첨가제(타르색소) : 황색5호알루미늄레이크

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

[성상] 주황색의 원형 필름코팅정(앞 : JS, 뒤 : D)

[효능·효과]

습진, 여드름, 두드러기, 피부발진, 기미, 주근깨, 햇볕에 탄 피부 등의 색소침착증, 약물에 의한 피부염, 전신(온몸)권태

[용법·용량] 성인(15세 이상) : 1회 2정, 7세 이상~15세 미만 : 1회 1정, 1일 3회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 중증 신기능장애 및 간성혼수

2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 시스틴노증 환자

2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 복용시 다음 사항에 주의할 것.

1) 때때로 구역, 두들게 설사, 구갈(목마름), 가벼운 복통(배아픔) 등의 증상이 나타날 수 있다.

2) 정해진 용법·용량을 지킬 것.

3) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.(6세 이하의 소아에는 투여하지 말 것.)

4. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의할 것.

1 개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

5. 보관 및 취급상의 주의

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [포장단위] 180정, 360정 [사용기간] 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.

※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) → [의약품 검색] 을 참조하십시오.

첨부문서 작성 연월일 : 2014. 09. 24

판매자


태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

☎고객 상담전화 080-300-8282

☎ <http://www.taiguk.co.kr>

제조사


JS제이에스제약(주)

전남 장성군 황룡면 강변로 484-28

☎비자상담전화: (061) 394-5530

DMD01-E01-01