

제산제

메빌^정

Mevil Tab.

분류번호 : 234(제산제)

현대인의 위장은 과음, 과식, 스트레스, 흡연, 많은 약물복용 등으로 혹사당하고 있습니다. 이런 여러가지 원인에 의해 위산이 과다하게 분비되고 이 위산이 위벽을 자극하여 상처를 낸으로써 위염, 위궤양으로 발전되기도 합니다. 메빌정은 위산을 소화에 지장이 없게 중화시키고 위장내 상처 부위를 피복 보호함으로써 위산과다, 위통, 속쓰림 등을 효과적으로 완화시킵니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정중

건조수산화알루미늄젤(U.S.P.) 250mg
(산화알루미늄으로서 125mg)

탄산마그네슘(약전) 160mg
(산화마그네슘으로서 67.2mg)

【성상】

백색의 타원형 정제

【효능·효과】

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】

성인 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】**1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.**

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 신장에 환자
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3. 이상반응

이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 장기연용을 하지 않습니다.
- 2) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용 전에 의사 또는 약사와 상의 합니다.
- 3) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 4) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지 하고 약사 또는 의사와 상의 합니다.

5. 소아에 대한 투여

이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 서늘한 곳에 보관합니다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

100, 1000정

【제품문의처】

소비자 상담실 : 080-587-7575(수신자 요금부담)

※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국개설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

설명서 개정연월 : 2009.12

<http://www.myunginph.co.kr>

MVT 1209-06



제조판매원

명인제약주식회사

경기도 화성시 팔탄면 노곡리 186-1

※ 본 의약품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 본 의약품과 함께 보관하십시오.