

어린이 보호용
안전포장 도입!

효과빠른 종/합/감/기/약

속콜F® 캡슐

속콜 F는 환절기에 발생하기 쉬운 급성 호흡기 감염증인 감기에 대해 그 증상인 콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래의 호흡기 증상과 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통의 전신증상에 효과있게 대처할 수 있는 성분이 안정적으로 배합된 종합감기약입니다.

성
성 분 · 합 량

이 약은 황색의 과립상 분말이 들어있는 상주홍색, 하:백색의 경질캡슐제입니다.

1캡슐 중	
아세트아미노펜(약 전)	200mg
dl-염산메칠에페드린(약 전)	8mg
브롬화수소산덱스트로메토르판(약 전)	7.5mg
말레인산클로르페닐아민(약 전)	1mg
염화리소짐(식약청고시 제98-127호)	10mg(역가)
무수카페인(약 전)	20mg
질산치아민(약 전)	4mg
리보플라빈(약 전)	2mg
감초건조엑스(100→7)(별 규)	12mg
(글리시리진산으로서 7.4mg)	

약 리 작 용
특 장 및 점

1. 해열 진통 성분인 아세트아미노펜이 열을 내리고 통증을 경감시켜 줍니다.
2. 항히스타민제인 말레인산클로르페닐아민은 감기의 특징적인 증상인 콧물, 재채기, 코막힘 등의 증상을 완화시켜줍니다.
3. 소염효소제인 염화리소짐이 인후주위의 염증을 소실시켜 목아픔과 쉼소리들을 개선시켜 줍니다.
4. 해소중추에 직접 작용하는 브롬화수소산덱스트로메토르판과 기관지 확장제인 염산메칠에페드린이 기침을 가라앉힙니다.
5. 첨가된 두가지 비타민제는 면역기능과 체력의 회복을 돕습니다.

효 능 · 효 과

감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

용 법 · 용 량

성인 1일 3회, 1회 2캡슐을 식후 30분에 복용하십시오.

사 용 상 의
주 의 사 항

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
2. 다음 사람은 복용하지 마십시오.
1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람.
2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람.
3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
1) 본인 양친 또는 형제등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
2) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세이하의 어린이.
4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람.
5) 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람.
6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부.
7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.
8) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
9) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
10) 부종이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
1) 본제의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.

2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.

3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.

5. 부작용

피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증) 이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진, 발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상을 이 전신의 피부 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

6. 복용할 때 다음 사항에 주의하십시오

- 1) 용법, 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타난다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담 하십시오.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 기슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우.
 - ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우.
 - ③ 천식이 나타난 경우.
- 3) 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오.
진해거담약, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등.
- 4) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량 투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
- 5) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
- 6) 3개월미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세미만의 유아에는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.

7. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오

- 1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.
- 2) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
- 3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
- 4) 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
- 5) 장기 연용하지 마십시오.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

10, 12, 24, 30, 120, 200, 300, 600 캡슐

기밀용기, 실온(1 ~ 30℃)보관

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국 또는 사무소를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부가 고시한 소비자피해 보상규정에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

P0612-06

포장 개봉 방법



1. 절취선을 따라 낱개로 자릅니다.



2. 화살표 부분부터 뒷면종이를 벗겨 냅니다.



3. 앞부분을 눌러 호일로부터 알약을 꺼냅니다.



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr