KGMP
전문의약품

HEALTHFUL LIFE BEAUTIFUL LIFE
MEDICA KOREA

소화기 기능이상 치료제

크레치콘® 캡셀

(분류번호 : 239)

CRETHICONE Cap.

저희 메디카코리아는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 아름다운 회사, 불우한 이웃과 장애인을 결코 소홀히 하지 않는 회사, 진정한 제약회사가 되고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약품 하나 하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디카코리아 임직원들의 열과 땀이 배어있습니다.

복잡한 생활환경으로 인해 규칙적인 식생활습관을 가지기 어려운 현대인은 과중된 스트레스, 과음, 과식, 편식 등에 의한 신경성 소화불량증, 위·십이지장궤양, 과민성대장증후군 등의 신경성 소화기능 장해현상이 빈발하게 됩니다.

크레치콘캡셀은 위장관 및 중추에 이중적으로 작용하는 도파민수용체 길항제로서 각종 소화기계 기능을 정상화시키며 위·장내 가스를 제거하는 성분이 이상적으로 배합된 위장관운동 개선제입니다.

▣ 성분·함량 : 1캅셀중

말산클레보프리드(식약청고시) ..... 0.68 밀리그람
시메치콘(유.에스.피) ..... 200 밀리그람

▣ 약리작용 및 특장점

1. 강력하고 선택적인 위장관 평활근의 도파민 수용체 차단작용 및 가스제거작용을 통해 약화된 연동운동을 정상화시키고 위내 용물의 배출을 촉진시킵니다.
2. 위장관 기능의 이상을 신속히 정상적으로 조절시켜주고 고창에 수반하는 소화기 이상증상을 치료합니다.
3. 가스제거 작용을 갖는 "시메치콘"이 보강되어 있으므로 상복부 통, 복부팽만감 등의 가스증상을 신속하게 소실시켜 줍니다.

▣ 성 상

백색의 분말이 든 상부 적색, 하부 백색의 경질캅셀제

▣ 효능·효과

1. 공기연하증 및 고창에 수반하는 다음의 소화기능이상 : 고창성 소화불량, 신경성 위장장애, 과민성대장증후군
2. 엑스선 촬영시 장내 가스제거
3. 수술후 고창에 수반하는 소화기능 이상

▣ 용법·용량

성인 1회 1캅셀 1일 3회 식전에 복용하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

▣ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 위장출혈.폐색.천공 환자
   2) 신경이완제를 투여받고 있는 만발성 운동장애 환자
2. 다음 경우에는 신중히 투여하십시오.
   고령자
3. 부작용
   1) 정신신경계 : 때때로 졸음, 초조감, 불면, 동요감, 입술.혀의 마비, 수족마비 등이 나타나는 경우가 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.

2) 추체외로계 : 드물게 구강의 경직, 유연 및 경부의 근경직 등이 나타나는 경우가 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
3) 소화기계 : 때때로 변비, 구역 또한 드물게 구갈, 식욕부진, 공복감, 설사 등이 나타나는 경우가 있습니다.
4) 피부 : 드물게 피진, 가려움증, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이와같은 경우에는 투여를 중지하십시오.
5) 내분비계 : 드물게 유즙누출, 과프로락틴혈증, 유선긴장, 무월경, 월경이상, 여성형유방, 발기부전이 나타날 수 있습니다.
6) 간장 : 때때로 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있습니다.
7) 혈액 : 메트헤모글로빈혈증이 나타날 수 있습니다.
8) 기타 : 때때로 탈력감, 권태감, 드물게 수명감이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의
1) 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반한 기계조작에는 종사하지 않도록 주의하십시오.
2) 진토작용에 의하여 장폐색, 뇌부종 등에 의한 구토증상을 은폐할 우려가 있으므로 충분히 관찰하고 신중히 투여하십시오.

5. 상호작용
1) 페노치아짓계 및 항도파민계 약물의 중추신경계에 대한 작용을 증강시킬 수 있습니다.
2) 디곡신 및 시메티딘의 효과를 감소시킬 수 있습니다.
3) 항콜린성 약물과 마약성 진통제는 소화관 내에서 이 약의 효과를 감소시킬 수 있습니다.
4) 알코올, 신경안정제, 수면제 또는 마약류와 병용투여시 진정작용이 나타날 수 있습니다.

6. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.

7. 임부에 대한 투여
임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 때에만 투여하십시오.

8. 수유부에 대한 투여
동물실험에서 유즙으로의 이행이 보고되어 있으므로 투여중에는 수유를 피하는 것이 바람직합니다.

9. 과량투여시의 처치
과량투여시 졸음, 방향감각 상실, 추체외로증상 등이 나타날 수 있으며 위세척 및 대증요법을 실시하십시오. 추체외로증상 치료에는 항파킨슨제, 항콜린제, 항히스타민제 등을 투여할 수 있습니다.

▣ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

▣ **포장단위** : 자사포장단위

※저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통하여 제조됩니다. 혹시 사용기한이 경과되었거나, 유통과정중 변질, 훼손된 제품은 구입경로를 통하여 교환하여 드립니다.
※제품문의 및 상담 : (02) 842-4760 개발부

MK0208282

(주)메디카 코리아
경기도 화성시 향남면 상신리 904-6