

중성비타민 C 보급제
뉴트랄씨 정
(아스코르브산칼슘)
300정

【원료약품의 분량】1정 중

아스코르브산칼슘(USP) 650mg

* 첨가제(타르색소) : 황색4호

【성 상】

황색 내지 미황색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 괴혈병의 예방과 치료
2. 비타민 C 요구량이 증가하는 다음 질환 :
소모성 질환, 만성 질환, 감염질환
3. 다음 경우의 비타민 C의 보급
 - 1) 과도한 흡연
 - 2) 외상(상처), 화상, 골절, 창상, 혈관계 질환으로 인한
비타민 C의 수요 증대

【용법·용량】

8세 이상 어린이 및 성인 : 아스코르브산칼슘으로서 1회
650mg을 1일 3회 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 이 약 및
이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자 2) 부갑상선 호르몬
복용 또는 비타민 D의 과량 복용으로 고칼슘혈증이 유발된
환자 또는 칼슘대사장애자 3) 통풍환자 및 시스틴뇨증 환자
4) 고수산뇨증(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설
되는 상태), 지중해빈혈증 환자 5) Glucose-6-phosphate
dehydrogenase (G6PD) 결핍환자 : 고용량을 투여할 경우
용혈을 초래할 수 있습니다. 6) 신장의 수산결석 환자 : 1일 1g
이상 투여할 경우
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오. 1) 임신
중, 고용량을 투여할 경우, 신생아의 괴혈병을 초래할 수
있으므로 주의합니다. 2) 과도한 음주나 흡연을 삼가합니다.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사,
약사와 상의하십시오. 1) 임부·수유부 2) 신장의 수산결석
환자 3) 경구용 항응고제(쿠마린계 약물)를 복용 중인 환자
(경구용 항응고제의 반응을 약화시킬 수 있습니다.) 4) 살리실
산염, 아스피린, 철분제, 페니토인 및 일부 항전간제, 에스
트로겐이 포함된 경구용 피임약, 테트라싸이클린계 항생제,
플루페나진, 오르리스타트를 복용 중인 환자(바람직하지 않는
상호작용을 초래할 수 있습니다.) 5) 바르비탈산 유도체를
복용 중인 환자(이 약의 신장배설을 촉진합니다.) 6) 코르티
코스테로이드제를 복용 중인 환자(이 약의 산화를 증가시킵
니다.) 7) 흡연자, 만성적으로 알코올을 섭취하는 사람
4. 다음과 같은 경우, 이 약을 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과
의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를
소지하십시오. 1) 구역, 구토, 설사, 속쓰림 2) 안면홍조, 두통,
불면 3) 과량투여로 인한 신장결석, 요의 산성화, 수산염 결석
의 침전

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘
지키십시오. 2) 1개월 정도 투여 하여도 증상의 개선이 없을
경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 3) 장기간 고용량을
투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다. 4) 각종 요검사시에
혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하
십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고
서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오. 3) 오·
남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위하여 다른 용기에
넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【최종 개정연월일】 2014. 07. 01

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품
입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된
제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다. 최종 개정연월일
이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dalimpharm.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.
※ 본 제품의 허가사항은 식약처 의약품사이트(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)
→ 「정보마당」 → 「의약품등 정보」에서 확인하실 수 있습니다.

【제조번호】

【사용기한】

제조원

dalim(주)다림바이오텍

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 107
공장 및 연구소 : 031) 353-6091
소비자상담실 : 080) 333-1656(수신자 부담)

