

Chondroitin + Vitamin 함유제제

비타콘-플러스

연질
캡슐

VITACON-PLUS Soft capsule

일반 의약품

분류번호:312

나이가 들면서 관절, 근육기능이 저하되고 혈액순환이 원활하지 않게 되어 쉽게 피로를 느끼며 신경통, 관절통, 수족저림, 눈의 피로같은 만성질환이 오게 됩니다.

비타콘플러스연질캡슐은 이런 분들께 신체의 기능을 활성화시키기 위해 고안된 복합 성인영양제입니다. 비타콘플러스연질캡슐에는 관절과 결합조직의 주성분인 황산콘드로이틴나트륨과 원활한 대사기능에 필요한 각종 비타민등이 배합되어 스트레스와 만성피로에 시달리는 직장인, 신경을 집중해야하는 수험생에게 우수한 효과를 나타냅니다.

● 원료약품의 분량 : 1캡슐중

황산콘드로이틴나트륨(KPC)	200 mg
감마-오리자놀(KPC)	5 mg
질산치아민(약전)	13mg
초산토코페롤(약전)	20 mg
염산피리독신(약전)	10 mg
시아노코발라민(약전)	30 μ g
판토텐산칼슘(약전)	15 mg
니코틴산아미드(약전)	10 mg
이노시톨(약전)	30 mg
파라옥시안식향산메칠(약전)	0.59mg
파라옥시안식향산프로필(약전)	0.15mg

● 성 상 : 황색의 내용물을 함유한 진한 초코렛색의 장방형 연질캡슐제


● 약리작용 및 특징점

1. 관절조직의 원활한 작용과 골화에 기여하여 탄력성, 유연성을 증진시키므로 신경통, 관절통을 개선시킵니다.
2. 신진대사 활성화, 세포에 영양공급, 피로물질 제거로 육체피로를 해소시켜 줍니다.
3. 내분비계와 자율신경계 기능을 효과적으로 조절하여 정신적 피로와 만성피로에 효과를 나타냅니다.

● 용법 · 용량 : 성인 및 8세 이상의 어린이 : 1일 2회, 1회 1캡슐씩 복용

● 효능 · 효과

- 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력저하시, 노년기의 비타민 B₁, B₆, E 보급
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통 등), 각기, 눈의 피로



경남제약주식회사
충남 아산시 신창면 읍내리 80-24

첨부문서 작성일자
2006. 4. 18

● 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1)이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2)3개월 미만의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1)의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2)임부·수유부
3. 부작용
 - 1)이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
-구역, 구토, 묽은변, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 식욕부진, 복부팽만감.
 - 2)이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 3)에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4)피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병적 증상(neuropathy:말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 5)엽산이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 6)고용량투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment:신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 과요산혈증(hyperuricemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 4.일반적 주의
 - 1)정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2)어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.
 - 3)1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 5.상호작용
 - 1)이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
-레보도파
- 6.저장상의 주의사항
 - 1)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2)직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3)오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

● **사용기간** : 제조일로부터 36개월

● **저장방법** : 기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

● **포장단위** : 100, 200캡슐

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 학술부로 문의하시기 바랍니다.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 병·의원 약국 및 도매상을 통하여 교환해 드리며 재정경제부고시 "소비자피해 보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
(문의 전화 : 031-260-9161, 학술부)

【최신 정보 확인 방법】

이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.kyungnampharm.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.