

복합소화제

삼진비스라제정

Compound stomachic digestives

Samjin **Bisrase** Tab.

일반의약품
분류번호 239

KGMP
적격업체제품

■ 원료약품의 분량 : 1정 중

메타규산알루미늄산마그네슘(식약청고시).....	125mg
(산화알루미늄으로서 40.38mg, 산화마그네슘으로서 15.88mg)	
탄산수소나트륨(약전).....	200mg
탄산마그네슘(약전).....	65mg
(산화마그네슘으로서 27.3mg)	
알디옥사(약전).....	25mg
(알루미늄으로서 3.01mg)	
(총산화알루미늄으로 46.07mg, 총산화마그네슘으로 43.18mg)	
스코폴리아엑스(약전).....	5mg
(총알칼로이드(히요스시아민 및 스코폴라민)로서 0.05mg)	
비오디아스타제 1000(별규).....	15mg
(전분호화력(pH5.0) 225단위, 단백소화력(pH6.0) 210단위)	
리파제 II(식약청고시).....	5mg
(지방소화력(pH6.0) 30단위)	

■ 성상 : 녹색의 장방형 필름코팅정제

■ 효능 · 효과

과식, 소화불량, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 소화촉진, 식욕감퇴(식욕부진), 식체(위체), 위부불쾌감, 속쓰림, 구역, 구토, 신트림, 위산과다, 위통

■ 용법 · 용량 : 성인 1회 2정, 1일 3회 식후 또는 식간 복용

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말것.
투석요법을 받고 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할것.
 - 1) 인산염 저하가 있는 환자
 - 2) 이 약으로 인해 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 부작용
 - 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움증 등)이 나타날 때에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.
 - 2) 이 약을복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 수 있다.
 - 3) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의
 - 1) 장기연용을 하지 않는다.
 - 2) 심장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것
 - 4) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 때에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.
 - 5) 위장 진통, 진경제와 함께 복용하지 말 것.
 - 6) 이 약은 7세 미만의 유 · 소아에게 복용시키지 말 것.
5. 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
 - 3) 오용을 피하고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 10정, 100정

※ 의사 · 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 주의

1.의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

2.허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.

3.PTP포장을 개봉하여 복용시 가끔 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리 기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2007년 11월 16일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)를 통해 알 수 있습니다.

11007

BSM-03-06-1171

제조판매원

SAMJIN

삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 서교동 338-8

공 장 : 경기도 화성시 향남읍 상신리 904-2

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031)353-1712/6