

삼진 로페베린TM (캡슐)

Lopeberin[®] Cap.

일반의약품
분류번호 237

KGMP
적격업체제품

■ 원료약품의 분량

1캡슐 중	
염산로페라미드 (약전).....	0.25mg
염하베르베린 (약전).....	20.0mg
아크리놀 (약전).....	20.0mg
스트렙토코카스페칼리스 F-100균 (식약청고시).....	5mg
(생균수로서 5×10 ⁷ 개)	

■ 성 상 : 황색의 분말이 든 상 · 하부 농황색의 경질캡슐체

■ 효능 · 효과

설사, 복통을 수반하는 설사, 묽은 변, 식체, 토사

■ 용법 · 용량

성인(15세이상) 1회 2캡슐, 1일 2회 복용
설사가 멈추면 복용하지 말 것
복용시간은 4시간 이상으로 한다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 지금까지 이 약에 의한 알러지 증상, 예를 들면 발진, 발적, 가려움 등을 나타낸 적이 있는 사람
 - 발열을 수반하는 설사가 있는 사람
 - 고령자
 - 혈변이 있는 사람, 점액변이 계속되는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람
 - 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 부작용
 - 이 약의 복용에 의해 알러지 증상 (예를 들면 발진, 가려움등)이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 이 약의 복용에 의해 변비가 생길 수 있음
특히 변비를 피하지 않으면 안되는 항문질환등이 있는 사람은 주의해서 복용할 것.

3. 일반적 주의

- 정해진 용법 · 용량을 준수할 것
 - 이 약은 소아에 복용시키지 말 것.
 - 급성기의 격심한 설사의 경우 또는 구기, 복통, 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사의 경우 이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하는 경우 병세를 악화시키는 일이 있으므로 이와 같은 경우에는 복용에 대해서 의사 또는 약사와 상담할 것.
 - 복용중에는 음주하지 말 것.
 - 5일간 복용해도 증상의 개선이 보이지 않을 경우는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
- ## 4. 보관 및 취급상의 주의
- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
 - 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 10캡슐

※ 주의

- 의약품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 - 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 - PTP포장을 개봉하여 복용시 가끔 캡슐체에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 캡슐체에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.
- ※ 본 의약품은 우수 의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한제품입니다. 만약구입시 사용기한 또는 유효기간이 경과 되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 의사 · 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2007년 9월 14일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화080-082-1234)를 통해 알 수 있습니다.

09007

LPM-03-07-1171

제조판매원
SAMJIN 삼진제약주식회사
본 사 : 서울특별시 마포구 서교동 338-8
공 장 : 경기도 화성시 향남읍 상신리 904-2
☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031)353-4712/6