

알마탄정

일반 의약품

분류번호: 234

Almatan Tab.

현대인들이 가장 많이 받고 있는 정신적 스트레스와 자극적 음식물의 섭취는 위산분비를 자극하여 과도한 위산 때문에 속쓰림, 신트림, 위통과 같은 증상이 나타나게 됩니다. 알마탄정은 건조수산화알루미늄겔과 탄산마그네슘이 이상적으로 배합되어 있어 과다한 위액으로부터 손상되기 쉬운 위점막을 보호, 수렴, 흡착하고 pepsin의 불활성화 작용을 가지고 있습니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

건조수산화알루미늄겔 (USP) 250mg

탄산마그네슘 (KP) 166mg

첨가제 (동물유래) : 유당수화물 (소의 원유에서 유래), 젤라틴 (소의 가죽에서 유래)

【성 상】 백색의 원형정제

【효능·효과】

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】

성인 1회 2정을 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 투석요법을 받고 있는 환자

2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 (젖당분해효소) 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 말 것.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 신장에 환자 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3. 부작용 : 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.

2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.

3) 장기 연용을 하지 않는다.

4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 소아에 대한 투여 : 이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 1000정

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관 (1~30℃)

* 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

* 첨부문서를 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 의약품은 우수의약품제조관리기준 (KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부 [Tel:02-580-5900(대)]로 문의하여 주시기 바랍니다. 제품의 변경사항은 당사 홈페이지 (www.newgenpharm.com)의 각 제품란에 기재되었으며, 의약품용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭 (<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→[정보마당]→[의약품등 정보]를 참고하시기 바랍니다.

개정년월일 : 2013. 07.08

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



생명공학 제약기업

(주) 뉴젠팜

전라북도 익산시 석암로 9길 117



P-3-2-424 0001