

장의 리듬을 위한 변비약

리듬큐정

분류번호: 238

일반의약품

Rhythm-Q Tab.

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며,
제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

도큐세이트나트륨(유·에스·피).....20mg
센나엽엑스(별규).....20mg
(하이드록시안트라센유도체로서 2.0mg)

비사코릴(약전).....6mg
백작약엑스산(식약청고시).....90mg
(페오노플로린으로서 1.8mg)

· 젤라틴 < 기원 : 소, 사용 : 가축 >

【내용량】

- 리듬큐 10정 : 556mg × 10정 (총 중량 5.56g)
- 리듬큐 200정 : 556mg × 200정 (총 중량 111.2g)
- 리듬큐 500정 : 556mg × 500정 (총 중량 278g)

【성 상】 녹색의 원형 장용성 당의정

【효능·효과】

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 입맛없음(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질
- < 다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다 >

【용법·용량】

- 성인 및 15세 이상 : 1회 1~2정을 1일 1회 취침시 복용합니다.
- 다만, 초폐는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 복용량을 늘리거나 줄이십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
(1) 급성 복부질환(중수염, 장출혈, 경양성 결장염 등) 환자
(2) 창자 막힌 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오
(1) 심한 복통 또는 구역, 구토 환자
(2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
(3) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
(4) 이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

- 1) 이 약을 투여함으로써 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의하십시오

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오
- 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오
- 3) 반드시 필요한 경우 이외에는 10세 이하의 소아에는 투여를 피하는 것이 바람직합니다.
- 4) 자극성 완화제는 장기간 계속사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 사용해서는 안됩니다. 만약 매일 변비가 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사하여야 합니다.

5. 소아에 대한 투여

- 1) 이 약은 7세 미만의 영·유아에게 투여하지 마십시오
- ## 6. 저장상의 주의사항
- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10, 200, 500정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

- * 본 제품은 '의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)'에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효기간이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2006년 04월 17일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(나대화제약 개발부(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일 : 2006년 04월 17일



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공정·강원도 황성군 황성읍 마산리 318
http://www.dhpharm.co.kr

우수의약품제조관리기준

KGMP적격제조제품