

의약품	322
분류번호	무기질제제

새로운 빈혈치료제

헤로큐빈연질캡슐

철결핍성 빈혈은 전체빈혈의 60-80%를 차지하는 질환으로 혈액세포중 하나인 적혈구의 생성에 필요한 철분 부족으로 발생합니다. 적혈구는 혈액 중 붉게 보이는 성분으로 체내 다양한 기관의 세포에 산소를 공급해주어 신진대사를 원활하게 합니다. 만약 체내 세포에 이러한 산소공급이 제대로 되지 않으면 기본적인 신진대사 기능장에는 물론 현기증, 두통, 귀울림 등의 증상이 흔히 나타나게 됩니다.

헤로큐빈연질캡슐은 철결핍성 빈혈에 효과적인 철분 외에도 시아노코발라민, 엽산 및 아스코르빈산이 한꺼번에 복합 처방된 빈혈약으로 임신기나 영양부족시, 각종 출혈 등에 의해 발생할 수 있는 철결핍성 빈혈의 치료에 효과적입니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

푸마르산철(KP)	200 mg
(철로서 66mg)	
시아노코발라민(KP)	10 µg
엽산(KP)	1mg
아스코르빈산(KP)	250 mg
파라옥시안식향산메틸(KP)	0.85 mg
파라옥시안식향산프로필(KP)	0.17 mg

【성상】

암적갈색의 내용물이 든 흑색의 연질캡슐제이다

【특장점】

1. 헤로큐빈연질캡슐은 철결핍성 빈혈에 효과적인 고용량의 푸마르산철 외에도 시아노코발라민, 엽산, 아스코르빈산이 복합 처방된 빈혈약입니다.
2. 헤로큐빈연질캡슐은 빈혈에 1일 1회 1캡슐로 간편하게 복용할 수 있습니다.

【효능·효과】

철 결핍성 빈혈

【용법·용량】

성인 1일 1회 1캡슐을 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
- 2) 혈색소증(철대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증 환자
- 3) 비철결핍성 빈혈 (예 : 비타민 B12 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈)환자
- 4) 악성빈혈(pernicious anemia) 환자 (엽산을 함유하고 있다.)
- 5) 12개월 미만의 영아

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염
- 2) 먹는 테트라사이클린 제제
- 3) 탄산칼슘, 수산화마그네슘 등이 함유된 제산제(철분의 흡수를 저해한다.)
- 4) 알로푸리놀(헤모시데린침착증을 일으킬 수 있다.)

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유·유제품은 복용중 또는 복용전후에는 피할 것.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 2) 고수산노증(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 환자
- 3) 임부 및 수유부
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자.

- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.)

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 상복부불쾌감, 구역, 구토, 위통, 복통, 위경련, 설사, 변비
- 2) 피부 : 때때로 소양감이 나타날 수 있으며 햇빛 노출시 피부 과민반응, 두드러기, 홍반, 피부발진, 가려움, 전신 등에서의 알레르기 증상
- 3) 기타 : 때때로 명치부위 통증이 나타날 수 있으며, 부기, 체중감소, 열, 혼수
- 4) 염산이 부족한 환자에게 Bi_2 를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 발생할 수 있다.
- 5) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부기 등의 증상이 나타날 수 있다.

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 이 약은 염산을 함유하고 있어 악성빈혈환자에게 투여할 경우 혈액상태는 개선되지만 신경증상에는 효과가 없으므로 진단이 확립되지 않은 악성빈혈환자가 이 약을 복용할 경우 악성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 될 수 있으므로 주의할 것.
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 3) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 4) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 5) 임상검사치에의 영향 : 각종 요검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 6) 아스코르빈산(비타민 C) 200mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 두개를 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 잘못 사용·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 15~30℃에서 보관, 제조일로부터 24개월

【포장단위】 60연질캡슐, 120연질캡슐

【제품 문의처】 080-424-7999

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 재정경제부 고시에 의거 보상받을 수 있습니다.(만약, 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

31306232

※ 주의

1. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
2. 직사광선(또는 열)에 약하므로 과도한 햇빛노출이나 고온 보관은 삼갈 것.
3. 포장을 개봉하여 복용 시 가름 연질캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 연질캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의할 것.

설명서 개정연월: 2006. 10.

생산
Hanmi 한미약품(주)
경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

판매원
Hanmi 한미FT(주)
서울특별시 송파구 방이동 48-9

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월 이후 변경된 내용은 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.