

갱년기 증상, 말초혈행 개선 토리잘® 골드 연질캡슐

일반의약품

의약품 분류번호	315 비타민 E 및 K제
-------------	-------------------

인간은 일상생활에서 다양한 신진대사를 하며 이에 따른 여러 종류의 활성산소를 생성하게 되는데 이렇게 생성된 활성산소는 체내 세포손상을 입혀 각 기관의 세포기능장애를 일으키고 이로 인한 노화를 촉진하게 됩니다. 이렇게 노화가 진행되면 혈액순환장애, 고지혈증, 관상동맥질환 및 신경계손상과 같은 다양한 성인병의 진행을 가져오게 되는데 신진대사가 활발한 청장년층의 경우 이러한 일련의 신체내 문제점들이 다양한 방어기전을 통하여 정상적인 신체균형을 되찾지만 갱년기 이후 노화가 진행됨에 따라 이러한 방어기전이 약해지게 되고 노화가 급속히 진행되게 됩니다. 토리잘골드연질캡슐은 이러한 여러 노화에 따른 증상을 경감시키기 위한 제품으로 자율신경조절기능, 항산화 및 말초혈행순환을 개선시키기 위한 감마오리자놀과 고향량(1000IU)의 천연토코페롤을 함유한 남녀가 함께 복용할 수 있는 성인용 혈액순환개선제입니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

토코페롤(USP)..... 1,000mg
(비타민E로서 1,000IU)
γ-오리자놀 (KPC)..... 10.0mg
첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색4호

【성 상】 미갈색의 내용물이 든 녹색의 연질캡슐제

【작 용】

1. 천연토코페롤 및 감마오리자놀을 함유한 토리잘골드연질캡슐은 강력한 항산화제로서 세포손상을 일으켜 노화를 촉진하는 활성산소를 강력하게 저해합니다.
2. 토리잘골드연질캡슐은 체내 지질(LDL)의 산화를 방지하여 이로 인한 관상동맥질환예방에 효과가 있습니다.
3. 토리잘골드연질캡슐은 모세혈관을 강화시키며 콜레스테롤의 혈관벽 침착 또는 응혈이나 혈전에 의한 말초혈관 장애를 방지하고 어깨·목결림, 수족저림, 냉증에 효과가 좋습니다.
4. 신체 각 조직에 있어서 산소의 이용도를 높여 온몸 구석구석까지 피의 흐름을 도와주어 피부를 탄력있고 부드럽게 가꾸는 것을 도와줍니다.
5. 토리잘골드연질캡슐은 뇌하수체에 작용하여 호르몬 분비를 촉진, 생리 기능을 강화시키며, 호르몬은 아니지만 호르몬양 작용(hormone like action)이 있어 갱년기 이후에 나타나는 생리적 노쇠현상을 개선시킵니다.
6. 토리잘골드연질캡슐은 자율신경장애에 의한 갱년기장애, 불안, 긴장, 억울에 관여하는 심신증 개선에 효과가 있습니다.

【효능·효과】

- 비타민 E의 보급
- 노년기
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족(손발)저림, 수족(손발)냉증(차가움)

【용법·용량】 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
 - 3) 이 약 또는 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 4) 3개월 미만의 영아
2. 다음 환자는 신중히 투여할 것
(복용전 의사 또는 약사와 상의 할 것)
 - 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의 한다.
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용(먹는) 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전성의 위험이 증가 될 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 지방과부하로 특정한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
 - 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 적용상의 주의
본 제제는 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알러지 경력이 있는 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상의한다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
 - 3) 오(잘못사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

【포장단위】

60 캡슐

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
2. 직사광선(또는 열)에 약하므로 과도한 햇빛노출이나 고온보관은 삼갈 것.
3. 개봉 후에는 열 또는 습기에 의해 연질캡슐이 서로 붙을 수 있으니 뚜껑을 잘 닫아 보관할 것. (실리카겔(건조제)을 먹지 말 것.)

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의할 것.

설명서 개정연월일 : 2011. 12. 30

Hanmi 한미약품(주)
(본사)서울특별시 송파구 방이동 45
(공장)경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8 801121 010617

Ver. 01061002