

장기능개선 복합지사제 로페리드 캡슐

일반의약품

의약품 분류번호	237 정장제
-------------	------------

설사는 장의 연동운동(궂름운동)이 이상항진되어 소화되지 않은 액상 또는 액상에 가까운 묽은 변을 배설하는 것으로 대변의 횡수나 양이 증가하거나 경도가 감소하는 증상을 말합니다. 로페리드 캡슐은 급·만성 설사시에 장의 과도한 연동운동(궂름운동)과 경련을 신속히 해소시켜주는 유산균 및 살균제 함유 복합 지사제입니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

스트렙토코쿠스페칼리스 F-100균(KPC) (스트렙토코쿠스페칼리스균으로서 5×10^7 개)	5mg
로페라미드염산염(KP)	0.25mg
베르베린염화물수화물(KP) (무수물로서)	20mg
아크리놀수화물(KP)	20mg
첨가제(타르색소) : 황색203호 황색5호	

【성상】

황색가루가 들어있는 상부 등황색, 하부 유백색의 경질캡슐제

【특징】

- 로페리드 캡슐은 설사나 토사시에 장관벽의 근육층에 직접 작용하여 장의 연동운동(궂름운동)을 억제시키며 장경련을 막아 줍니다. 또한 장점막을 통한 전해질 및 수분의 이동을 증가시켜 변의 용적을 감소시키고 수분과 전해질 소실을 줄입니다.
- 로페리드 캡슐은 설사나, 토사, 식체(체함)와 같은 장내의 이상질환에 신속하고 효과적인 작용을 나타내는 유산균 및 살균제 함유 복합 지사제입니다.

【효능·효과】

설사, 복통을 수반하는 설사, 묽은 변, 식체(체함), 토사

【용법·용량】

성인(15세 이상)은 1회 2캡슐, 1일 2회 복용. 설사가 멈추면 복용하지 마십시오.
복용간격은 4시간 이상으로 합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 지금까지 약에 의한 알러지증상, 예를 들면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 나타낸 적이 있는 사람.
2) 발열을 수반한 설사가 있는 사람
3) 고령자(노인)
4) 혈변이 있는 사람, 점액변이 계속되는 사람
5) 임부 또는 임신하고 있을 것으로 생각되는 부인
6) 의사의 치료를 받고 있는 사람
7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 부작용
1) 이 약의 복용에 의해 알러지증상(예를 들면 발진, 가려움 등)이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상담하십시오.
2) 이 약의 복용에 의해 변비가 생기는 일이 있습니다.
특히 변비를 피하지 않으면 안되는 항문질환 등이 있는 사람은 주의해서 복용하십시오.
- 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 엄수하십시오.
2) 이 약을 식사에 복용시키지 마십시오.
3) 급성기의 격심한 설사의 경우 또는 구기(매스꺼움), 복통, 복부(배부분)팽만 등의 증상을 수반한 설사의 경우, 이 약으로 무리하게 설사를 멈추면 오히려 병세를 악화시키는 일이 있으므로, 이와 같은 경우에는 복용에 대해서 의사 또는 약사와 상담하십시오.
4) 복용시에는 음주하지 마십시오.
5) 2일간 복용해도 증상의 개선이 보이지 않는 경우는, 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 보관 및 취급상의 주의
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

【사용법】

①뚜껑 뒷부분을 누른상태에서 ②시계 반대 방향으로 돌려주세요.



※로페리드캡슐은 어린이들이 쉽게 개봉하기 어려운 어린이보호용 마개(CRC=Child-Resistant Closure)를 사용하여 약의 잘못사용, 남용 및 어린이 약물중독을 예방하고 있습니다.

【포장 단위】

자사포장단위

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

- 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
- 캡슐을 까서 복용하지 말 것.
- 개봉 후 충전물이 있을 경우 완전히 제거하고 사용할 것.(실리카겔(건조제)을 먹지 말 것.)

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
※ 본 제품은 흡습성이 우려되므로 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오※

설명서 개정연월일 : 2012. 07. 10

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지
(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8 801121 002223

Ver.00222005