

체력저하, 혈행장애

# 로가톤 골드

연질캡슐

일반의약품

|             |               |
|-------------|---------------|
| 의약품<br>분류번호 | 316<br>혼합비타민제 |
|-------------|---------------|

산소는 생명유지에 절대적으로 필요하나 체내 효소계, 산화환원대사, 화학약품, 공해물질 등 각종 요인에 의해 반응성이 매우 큰 활성산소가 되면 세포구성성분인 지질, 단백질, DNA 등에 대하여 비가역적인 파괴작용을 일으킴으로써 노화를 비롯하여 각종 질병을 일으키는 것으로 알려져 있습니다. 생체내에는 이들에 대한 방어기구로서 각종 항산화효소와 비타민E, 비타민C, glutathione과 같은 물질이 존재하며, 활성산소를 제거하여 세포의 산화적 손상을 방어하는 이러한 물질을 항산화제라고 합니다.

로가톤골드 연질캡슐에는 수용성 항산화제인 비타민C와 지용성 항산화제인 비타민 E 및 베타카로틴, 인체내에 존재하는 항산화효소인 glutathione peroxidase의 중요한 구성요소인 셀레늄 등 4가지 성분이 이상적으로 처방되어 있으며, 또한 비타민 B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub>와 같은 다양한 비타민 B군을 함유하고 있습니다.

로가톤골드 연질캡슐은 육체피로, 임신, 수유기, 노년기, 병중·병후의 체력 저하시 비타민 보급에 좋으며 말초혈행장애 및 갱년기시 나타나는 어께·목결림, 수족(손발)저림·수족냉증(손발차가움) 등의 증상 완화에 우수한 효과가 있습니다.

## 【원료약품의 분량】 1 캡슐 중

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 베타카로틴현탁액 30% (KPC) ..... | 50.0mg  |
| (베타카로틴으로서 15mg)          |         |
| 셀레늄함유건조효모 (KPC) .....    | 92.6mg  |
| (셀레늄으로서 50μg)            |         |
| 토코페롤아세테이트 (KP) .....     | 400.0mg |
| 아스코르브산 (KP) .....        | 500.0mg |
| 리보플라빈 (KP) .....         | 10.0mg  |
| 피리독신염산염 (KP) .....       | 7.3mg   |
| 시아노코발라민 0.1% (KPC) ..... | 1.8mg   |
| (시아노코발라민으로서 1.8μg)       |         |
| 니코틴산아미드 (KP) .....       | 20.0mg  |
| 티아민질산염 (KP) .....        | 12.34mg |

【성상】 적갈색 내용물이 들어있는 갈색의 장방형 연질캡슐제

## 【효능·효과】

- 비타민 A, E, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후의 체력저하시
- 노년기
- 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
- 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어께·목결림, 수족(손발)저림·수족냉증(손발차가움).

【용법·용량】 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용한다.

## 【사용상의 주의사항】

- 경고  
임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 I.U.이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가능성 있는 부인에는 비타민 A를 5,000 I.U./일 이상 투여하지 않는다.(비타민A 결핍증 환자는 제외)
- 다음 환자에는 투여하지 말 것  
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자  
2) 12개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)  
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자  
2) 과수산노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)  
3) 임부·수유부  
4) 심장·순환계기능 장애 환자  
5) 신장장애(신장장애) 환자  
6) 저단백혈증 환자  
7) 위장관질환
- 부작용  
1) 이 약 투여에 의하여 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 복부(배부분)팽만감, 위부불쾌감, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 식욕부진, 묽은변, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.  
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.  
3) 에스트로젠을 포함한 경구용(먹는) 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.  
4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.  
5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.  
6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B<sub>12</sub>를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.  
7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.  
8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의  
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.  
2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.  
3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 I.U.이상을 넘지 않도록 한다.
- 상호작용  
1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.  
2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않는다.  
가) 인산염, 칼슘염, 경구용(먹는) 테트라사이클린계 제제, 제산제  
나) 레보도파  
3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
- 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여  
외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000 I.U./일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000 I.U./일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
- 임상검사치에의 영향  
1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.  
2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 저장상의 주의사항  
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.  
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.  
3) 오(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 24개월

【포장단위】 자사포장단위

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.  
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)  
※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

## ※ 주의

- 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
- 직사광선(또는 열)에 약하므로 과도한 햇빛노출이나 고온보관은 삼갈 것.
- 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 연질캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 연질캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2012. 07. 06

**Hanmi** 한미약품(주)  
(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14  
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는  
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지  
(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8 80 112 100 1936

Ver.00193004