■ 원료약품의 분량 : 1정 중

건조수산화알루미늄겔(K.P)..... 250mg
탄산마그네슘(K.P).....160mg

■ 성상

백색의 장방형 정제

■ 효능 · 효과

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림

■ 용법 · 용량

성인 1회 3정, 1일 3회 식후에 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
   투석요법을 받고 있는 환자
2. 다음 환자에 신중히 투여할 것
   1) 신장애 환자
   2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3. 부작용
   이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.

8 806041 003183

PE
분리배출
라벨 : PP

KGMP
적격업체제품

234
일반의약품

속쓰림, 소화불량에

안타시드정

ANTACID Tab.

500정

중외제약 계열사
주식회사 대유신약
경기도 평택시 모곡동 441-8

2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 할 것.
3) 장기연용을 하지 않는다.
4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용 전에 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 소아에 대한 투여
   이 약은 7세 이하의 영 · 유아에게 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항
   1) 직사일광을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관할 것.
   2) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말것.

■ 저장방법

밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

■ 첨부문서 작성연월일

2004. 4. 8

*만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.

*이 첨부 문서 작성 일자 (2004년 4월 8일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 www.dyph.co.kr이나 마케팅부 02-2653-0250, 클로바서비스 080-652-0213에서 확인하실 수 있습니다.

제조번호:

사용기한:

JMH0404