

알부맥스[®] 캡슐

ALBUMAX Cap.

철-아세틸트랜스페린 (Iron acetyl transferrin)

철결핍성 빈혈은 전체 빈혈의 90%정도를 차지하며, 이는 식이성 결핍, 신생아 및 유아기에서의 적혈구량의 증가와 신생아 황달로 인한 철분손실, 급격한 신체발육, 특히 여성의 경우 월경, 임신, 분만 및 수유, 성인에서의 소화관출혈 등의 요구량 증가에 의하여 발생함이다.

알부맥스캡슐은 생체내 운반체인 아세틸트랜스페린에 철분을 결합한 철-아세틸트랜스페린을 주성분으로 하는 철분 보급제로서 철분제 복용에 따른 위장장애 및 낮은 흡수율을 개선한 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

철-아세틸트랜스페린(Iron acetyl transferrin)(별규)..... 200mg
(철로서 40mg)

【성 상】 적갈색의 분말이 충전된 상, 하 진갈색의 경질 캡슐제

【약리작용·특징】

1. 알부맥스캡슐은 위산에 안정하고, 장내에서 쉽게 가용화되는 성질을 가지고 있는, 높은 위장관내 흡수를 보이는 철분 보급제입니다. 또한, 성분내 철분농도가 높으며, 흡수후 직접 체내 사용 형태로 전환되므로 높은 생물학적 이용율을 나타내는 제제입니다.
2. 기존의 철분제에서 나타날 수 있었던 위장장애나 오심(구역)등의 위장관 부작용이 없을 뿐 아니라, 음식물과 함께 복용할 때도 흡수에 영향을 미치지 않으므로 장기간의 투여에도 높은 복용순응도를 나타냅니다.
3. 임상시험 결과 알부맥스캡슐은 성별 및 연령에 관계없이 다양한 환자들의 철결핍성 빈혈 개선에 우수한 효과를 발휘하며, 임상부 및 유·소아의 철분결핍 증상의 치료에도 안전하게 사용할 수 있는 제품입니다.

【효능·효과】 철 결핍성 빈혈 (다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.)

【용법·용량】 성인 : 철로서 1회 40mg(이 약으로서 1캡슐), 1일 1~2회 식사시간을 피하여 복용하십시오.

<병 개봉방법>



1. 뚜껑을 누르십시오.



2. 누른 상태에서 시계 반대방향으로 돌리십시오.



3. 뚜껑을 여십시오.

(※ 어린이가 쉽게 열지 못하도록 안전용기로 되어있습니다.)

【사용상의 주의사항】

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민 반응 환자
- 2) 12개월 미만의 영아
- 3) 혈액소중(철 대사 이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증(조직 장애는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의 (헤모시데린으로서의) 철 함유량이 증가한 상태) 환자
- 4) 철 이용 장애(예 : 납 중독으로 인한 빈혈, 철 불용성 빈혈, 지중해 빈혈, 만발성 피부 포르피린증) 환자