

효과빠른 해열·진통제 올나세트 (정)



일양약품

KGMP적격업체 / 일반의약품 / 분류번호 01140

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

원료약품 및 그 분량 : 1정 중

아세트아미노펜(KP) 450mg
DL-메티모난(KP) 45mg

첨가제(타르색소) : 황색203호, 황색5호

성상 : 미황색의 장방형 필름코팅정

효능·효과 : 두통, 치통, 발진(이물 뻘뻘) 후 동통(통증), 인후통(목구멍 통증), 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통(허리 통증), 근육통, 건통(어깨통증), 타박동, 골절통, 월경통(생리통), 외상(상처)등의 진통, 모한(춥고 떨리는 증상), 발열시의 해열.

용법·용량 : 성인 1회 1~2정, 1일 3~4회까지 공복(빈 속)시를 피하여 복용, 복용 간격은 4시간 이상으로 한다.
어린이 1회 : 7~14세 1/2정

사용상의 주의사항

1. 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하지 말 것

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적(홍혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열 진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기)·유아 및 어린이(14세 이하)
- 4) 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
- 5) 고령자(노년) 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부 가 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 8) 이 약은 황색5호(산셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것

- 1) 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것
- 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등
- 3) 메티모난과 레보도파의 병용투여(함께 복용)시 레보도파의 효과를 억제할 수 있으므로 의사, 약사와 상의할 것
- 4) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것

5. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적(홍혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
- 2) 수화(여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
- 3) 장기연용(계속 복용)하지 말 것

6. 복용시 주의사항

- 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것
(1) 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족(손발)이 차가워지고, 식은 땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
(2) 고열을 수반하며 발진, 발적(홍혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신 피부, 입 및 눈의 점막에 나타나는 경우
(3) 천식이 나타나는 경우
- 2) 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

7. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사일광(햇빛)을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 모용(질투 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

저장방법 및 사용기간 : 차광한 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 어린이 보호용 안전포장 적용 제품입니다.

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만일 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의 하시거나 또는 이지드럭(<http://ezdrug.kida.go.kr> → 정보마당 → 의약품 등 정보)에서 확인할 수 있습니다.

제조외회사 : 한솔신약(주) 충북 음성군 금왕읍 청평길2-11(도청리 33-32)

제조사 : 일리코제약(주) 충북 진천군 광혜원면 용소2길 21(회죽리 160-17)

판매원 : 일양약품(주) 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동 182-4)

첨부문서 개정년월일 : 2012. 02. 22