



위통 / 속쓰림 / 소화불량 / 구역에 -
란티딘
RANTIDINE Tab.

이 약을 복용하기 전에 기재사항을 반드시 읽어 주십시오.
또한 필요시에 읽을 수 있도록 보관하여 주십시오.

분 류 번 호	234
	제산제
의 약 품 분 류	일반의약품

란티딘정은 현재 위·십이지장궤양 및 위염에 널리 사용되고 있는 효과적인 위산분비억제제인 라니티딘염산염과 규산알루민산마그네슘, 산화마그네슘, 수산화알루민산마그네슘 등 3종의 제산제가 복합처방된 효과빠른 위장질환치료제입니다. 란티딘정에 함유된 3종의 제산성분이 1차적으로 위에서 과다분비된 위산을 신속히 중화하고, 2차적으로 라니티딘염산염이 위내의 H_2 -수용체를 차단하여 위산 및 펩신분비를 억제하는 복합적 이중작용으로 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역 등의 위장질환증상을 신속히 개선하여 주는 효과적인 위장질환치료제입니다.

【성분·함량】1정 중

라니티딘염산염(USP)	31.5mg
(라니티딘으로서 28.227mg)	
산화마그네슘(KP)	50mg
규산알루민산마그네슘(NF)	125mg
(산화알루미늄으로서 38.31mg, 산화마그네슘으로서 30.13mg)	
수산화알루민산마그네슘(KPC)	100mg
(산화알루미늄으로서 30mg, 산화마그네슘으로서 30mg)	

【성 상】 흰색의 원형 필름코팅정제

【약리작용 및 특징점】

1. 신속한 위산중화작용으로 위통, 속쓰림, 소화불량 증상을 빠르게 없애줍니다.

란티딘정에 함유된 규산알루민산마그네슘, 산화마그네슘, 수산화알루민산마그네슘 등 3종의 제산성분이 과다분비된 위산을 빠르게 중화시킵니다.

2. 강력한 위산분비억제작용으로 지속적인 위장질환 개선효과를 발휘합니다.

란티딘정에는 위내의 H_2 -수용체를 차단하여 위산 및 펩신분비를 억제하는 라니티딘염산염 성분이 들어있어 위산에 의한 위통, 속쓰림, 메스꺼움 등의 증상을 신속히 개선하여 줍니다.

3. 효과가 빠르고 지속적인 위장약입니다.

위산을 중화하는 3종의 제산제와 강력한 위산분비억제제인 라니티딘염산염의 복합작용으로 스트레스성 또는 음주 전후 및 불규칙한 생활 등 각종 원인에 의한 위통, 속쓰림, 소화불량 등의 증상을 신속히 없애주고, 위산분비를 원인으로 차단하여 지속적인 치료효과를 발휘합니다.

【효능·효과】 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

【용법·용량】

성인(15세이상, 80세미만) : 1회 2정씩 복용하되 복용 후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용하십시오. 단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 다음 질환으로 치료받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장·간장질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스 등의 면역계질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 2) 다음 약물을 투여받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아즐게 항진균제(때때로 백혈구감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 3) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상의 병력이 있는 환자(혈구수의 감소가 증가될 수 있습니다.)
- 4) 히스타민 H_2 -수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 사람
- 5) 소아(15세미만) 및 고령자(80세이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적습니다). 80세 이상의 고령자에게는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현될 수 있습니다.
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 하십시오.
- 7) 투석요법을 받고 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약제를 복용중인 환자 : 약물상호작용에 의해 부작용의 발현 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.

- 2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
- 3) 고령자(65세이상) : 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다.
- 4) 인후통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소 등의 혈액 이상이 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 이약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 부작용을 은폐시킬 수 있습니다.
- 5) 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 6) 복통이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.

3. 부작용

이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 알레르기증상(발진, 발적, 가려움, 부종), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(라니티딘염산염의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.)
- 2) 이 약의 복용후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우
- 3) 고열을 동반한 발진, 발적, 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
- 4) 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안쪽이 하얗게 변함, 출혈하기 쉽게 됨(치경의 출혈, 비출혈 등)이 나타나는 경우
- 5) 황달

4. 일반적인 주의

- 1) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2) 2주간을 초과하여 연용하지 마십시오.
- 3) 이 약을 복용할 시에는 알콜음료는 섭취하지 마십시오.(혈중 알콜농도를 높일 수있음)
- 4) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 5) 기재된 효능 이외의 증상에는 복용하지 마십시오.
- 6) 장기연용을 하지 마십시오.
- 7) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

- 1) 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있습니다.
 - 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등)
 - 뉴-퀴놀론계 항균제(오픈록사신 등)
- 2) 이 약을 다른 위장약과 병용하지 마십시오.

다른 위장약을 동시에 병용하면 작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다)

8. 고령자에 대한 투여(65세이상)

80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선이나 고온인 장소를 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오염을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 / 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60정

제조의뢰자 : 주식회사 새한제약 / 경기도 안성시 신소현동 162

제 조 자 : 주식회사 씨트리 / 경기도 남양주시 일패동 778-1

- ※ 이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 첨부문서 작성년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 (<http://www.shpharm.co.kr>) 및 전화(02-523-4271)에서 확인 할 수 있습니다.
- ※ 자세한 사항은 "이지드러그(ezdrug.klda.go.kr) 의약품 정보"를 참조하십시오.
- ※ 의약품을 어린이의 손이 닿지 않게 보관하여 주십시오.

작성년월일 : 2009. 8. 27