

복통을 동반한 소화불량·위장질환 치료에 최대효과

트리탈 삼중정 TRITAL triple-layer tablet

【성상】 상, 하층은 백색 내지 유백색이고 중간층은 연갈색인 원형 삼중정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중,

- 1층 : 말레인산트리메부틴 (식약청고시) 50mg
- 2층 : 비오디아스타제 2000Ⅳ (식약청고시) 20mg
- 리파제 Ⅱ (식약청고시) 7.5mg
- 스코폴리아엑스 3배산 (별규) (총 알칼로이드로서 0.05mg) 15mg
- 감초가루 (약전) (글리시리진산으로서 0.63mg) 25mg
- 3층 : 메타규산알루미늄마그네슘 (식약청고시) 40mg
- (산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로서 5.08mg)
- 침강탄산칼슘 (약전) 100mg
- 탄산수소나트륨 (약전) 50mg

【효능효과】 소화성 궤양에 따른 다음 증상의 개선 : 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식제(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량

【용법용량】 성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간 복용하십시오.

【사용상의주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
투석요법을 받고 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 인산염 저하가 있는 환자
2) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
3) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
4) 신장에 환자
5) 간장에 환자
6) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3. 일반적 주의
1) 장기연용을 하지 않습니다.
2) 신장병의 병력이 있는 환자에는 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
3) 정해진 용법, 용량을 잘 지키십시오.
4) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
5) 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
① 혈압이 높은 환자 또는 고령자
② 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
③ 부종이 있는 환자
④ 의사의 치료를 받고 있는 환자
6) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
① 본제의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.
② 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
③ 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.
7) 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의하십시오.
칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프제 이노제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드제 이노제(트리클로로메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.
4. 부작용
1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계, 졸음, 현훈, 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
4) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
5) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있습니다.
5. 상호작용
위장, 진통·진경제와 병용투여하지 않습니다.
6. 소아·임부에 대한 투여
1) 이 약은 소아(15세미만)에게는 투여하지 않습니다.
2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않습니다.
7. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
3) 오용을 막고 품질의 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 외부 포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

【포장단위】 10정, 100정, 500정, 1000정

※ 본 의약품은 KGMP업소에서 제조되어 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·파손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최신허가변경사항은 홈페이지(www.hanall.co.kr)에서 확인하시기 바랍니다.

※ 흡습성 변색·변형의 우려가 있으니 제품의 안정성을 위하여 반드시 사용 후 밀폐하여 주시기 바랍니다.



제조·판매원

한올제약주식회사

서울특별시 송파구 신천동 11-10

공장 : 대전광역시 대덕구 상서동 400-1

소비자전화 : 080-446-2300

www.hanall.co.kr

TRI-1-2
05-04-29