

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

분류번호 : 114(해열·진통·소염제) **일반의약품**

종합감기약

판콜® 에이 캡슐

PANCOLD®-A Capsules

판콜-에이 캡슐은 해열진통제, 비충혈제거제, 진해거담제, 항히스타민제 등이 이상적인 비율로 배합되어 코감기, 기침감기, 목감기, 몸살감기에 신속한 치료효과를 나타냅니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

아세트아미노펜(KP) - 200.0mg
 카페인무수물(KP) - 20.0mg
 dl-메틸에페드린염산염(KP) - 8.75mg
 구아이페네신(KP) - 41.65mg
 클로르페니라민말레산염(KP) - 1.25mg
 식약청인정타르색소(적색3호, 황색5호)

【성상】

내용물이 백색 내지 미황색 가루 또는 과립상인 상부 주황색, 하부 백색의 경질 캡슐제

【효능·효과】

감기의 증상(코물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】

성인 : 1회 2캡슐씩 1일 3회, 식후 30분에 복용하십시오.
 8~14세 : 1회 1캡슐씩 1일 3회, 식후 30분에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 사람은 복용하지 마십시오.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 신장, 갑상선 질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
- 6) 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부

8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 천식이 나타난 경우
- 2) 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
- 3) 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 4) 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오.
 - 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
- 5) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시키십시오.
- 6) 3개월미만의 영아에게는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고 복용시키지 않는 것이 좋습니다.

5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
 - 3) 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 4) 장기연용하지 마십시오.
- 6. 저장상의 유의사항**
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 판콜에이 캡슐 - 10캡슐

【문의전화】 본사 : (02)2021-9300

소비자상담실 : 080-023-1897(수신자 요금부담)

【제조(의)자】 동화약품(주)

본사 : 서울특별시 중구 순화동 5번지, 공장 : 충청북도 충주시 용탄동 504-3번지

【제조자】 (주)서홍캡셀, 경기도 부천시 소사구 송내1동 317번지

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※이 첨부문서 작성일자(2009년 11월 30일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.