

[성분 · 함량] 1정 중

메타규산알루미늄산마그네슘(KPC)	40mg
(산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로서 5.08mg)	
탄산수소나트륨(KP)	50mg
비오디아스타제 2000 IV(KPC)	20mg
스코폴리아엑스(KP)	5mg
(총알칼로이드(히요스시아민 및 스코폴라민)으로서 0.045mg)	
리파제 II (KPC)	7.5mg
감초가루 (KP)	25mg
(글리시리진산으로서 0.625mg)	
침강탄산칼슘(KP)	100mg
말레인산트리메부틴(KPC)	50mg

[성 상] 흰색의 장방형 당의정**[효능 · 효과]**

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구도, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법 · 용량]

성인 1회 2정, 1일 3회 매식후 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
투석요법을 받고 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움증)을 일으킨 일이 있는 환자
2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
3) 신장에 환자
4) 간장에 환자
5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
6) 인산염 저하가 있는 환자
- 부작용
1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계, 졸음, 현훈, 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
4) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 상호작용
위장진통, 진경제와 병용투여하지 않는다.
- 소아 · 임부에 대한 투여
1) 이 약은 소아(15세미만)에게는 투여하지 않는다.
2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않는다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 12, 120, 1000정

- ※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품 첨부문서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.arlico.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.