퇴행성 질환 개선, 비타민 보급

콘도비타

연질캡슐

일반의약품
분류번호 : 312

현대는 생활수준의 향상, 의료 수준의 개선 등으로 점차 노령층 인구의 증가가 뚜렷한 시대이며, 그로 인해서 나이가 들어감에 따라 신경통, 관절통, 수족저림 등 다양한 퇴행성 질환이 증가하고 있습니다.
콘도비타 연질캡슐은 관절의 주요 성분 중 하나로서 각종 관절 질환 개선에 효과가 좋은 황산콘드로이틴과 다양한 비타민을 배합한 제품으로서, 각종 퇴행성 질환의 개선 효과가 뛰어날 뿐 아니라, 항산화 성분인 토코페롤 등 각종 비타민의 작용으로 인체의 기능성 향상 및 체력 증진에 좋은 효과를 나타냅니다.

【성상】
등황색의 내용물이 들어있는 적자색의 장방형 연질캡슐

【원료약품의 분량】 1캡슐(1,402mg)중

황산콘드로이틴나트륨(식약청고시 제2000-14호)	200mg
푸르설티아민(식약청고시 제2000-14호)	50mg
초산토코페롤(약전)	50mg
니코틴산아미드(약전)	50mg
염산피리독신(약전)	25mg
판토텐산칼슘(약전)	15mg
낙산리보플라빈(약전)	6mg
감마오리자놀(식약청고시 제2000-14호)	5mg
0.1% 시아노코발라민(식약청고시 제2000-14호) (시아노코발라민으로서 30㎍)	30mg
파라옥시안식향산메칠(약전)	0.85mg
파라옥시안식향산프로필(약전)	0.17mg

【특장점】
1. 황산 콘드로이틴
   뮤코다당류의 일종으로 골격, 인대를 비롯한 주요 관절조직과 피부, 각막 등 인체 내에 널리 분포되어 있는 인체의 결합조직 성분입니다. 관절에 탄력성을 부여하고 뼈를 튼튼하게 하며 혈액의 원활한 흐름 및 피부에 탄력을 주어 피부 미용을 도와줍니다.
2. 토코페롤(Vitamin E)
   체내 유해한 활성산소는 세포의 구성성분을 파괴하여 노화는 물론 암, 각종 뇌질환, 심장 질환, 동맥경화 등 다양한 질환의 원인이 됩니다. 토코페롤은 이러한 활성산소를 억제하는 항산화제로 널리 알려져 있는 성분으로서, 중장년층에서 발생하기 쉬운 성인 질환을 억제하는데 우수한 효과를 나타냅니다.
3. 콘도비타 연질캡슐은 관절 및 피부에 좋은 황산 콘드로이틴, 항산화 성분인 토코페롤 외에 각종 비타민을 배합하여, 퇴행성 질환 개선과 더불어 피로회복, 체력 증진 효과가 좋습니다.

【효능 · 효과】
-다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통 등), 수족저림, 변비, 눈의 피로
-각기
-다음 경우의 비타민 B_1보급 : 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력저하시

【용법 · 용량】
8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 2회 복용합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   구성 성분에 과민증이 있는 환자
2. 다음 경우에는 신중히 투여하십시오.
   1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
   2) 임부, 수유부
3. 부작용
   1) 이 약 투여에 의해 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   2) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있습니다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
   3) 엽산이 부족한 환자에게 비타민B_{12}를 1일 10㎍이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 발생할 수 있습니다.
   4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상, 과요산혈증, 간손상을 일으킬 수 있습니다.
   5) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
   6) 피리독신을 1일 50㎎-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각 신경병 또는 신경병적 증상이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
   2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
5. 임상검사치에 대한 영향
   뇨의 황변으로 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
6. 보관 및 취급상의 주의
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
   2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.

【포장 단위】 120, 240 캡슐

【저장 방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용 기간】 제조일로부터 36개월

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.

소비자 상담실 (02)2041-8349
홈페이지 www.yungjin.co.kr

문서작성일 : 022702

제조발매원
영진약품공업주식회사
공장 : 경기도 화성시 무송동 470-5