

# 조이놀정

## 원료약품 및 그 분량 (1정 중)

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| 콘드로이틴설페이트나트륨(KPC).....                   | 400.0mg |
| ·기원동물 : 소 · 사용부위 : 뼈                     |         |
| 푸르셀티아민(KPC).....                         | 60.0mg  |
| 니코틴산아미드(KP).....                         | 50.0mg  |
| 피리독신염산염(KP).....                         | 25.0mg  |
| 판토텐산칼슘(KP).....                          | 15.0mg  |
| 리보플라빈부티레이트(KP).....                      | 6.0mg   |
| γ-오리자놀(KPC).....                         | 5.0mg   |
| 첨가제(타르색소) : 적색40호 알루미늄레이크, 청색1 호 알루미늄레이크 |         |

## 성상

임갈색의 장방형 필름제피정

## 효능 · 효과

1. 다음 경우의 비타민B1 보급 : 육체 피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
2. 이 약에 함유된 비타민의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
  - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨 결림, 어깨 통증) 등)
  - 각기, 눈의 피로

## 용법 · 용량

8세이상 어린이 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 식후 복용

## 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오
  - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
  - 2) 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오)
  - 1) 1세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
  - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 3) 임부, 수유부
3. 부작용
  - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오 : 구역, 구토, 뱀장어, 설사, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감
  - 2) 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상 (neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
  - 3) 고용량 투여에 의해 소화성 장애를 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과

임의로 존재 하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

#### 4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 투여하십시오.
- 3) 1개월 정도 투여 하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

#### 5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용(사용))투여하지 마십시오. : 레보도파

#### 6. 임상검사치에의 영향

요를 황색으로 변화게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

#### 7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 (뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용) · 남용을 피하고, 품질의 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지마십시오.

#### 저장방법

기밀 용기, 실온(1~30℃) 보관

#### 포장단위

90정, 180정

#### 취급상의 주의사항

- ※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질 · 변패 또는 오염 및 손상된 제품이 발견 될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 작성일자(2011년 02월 10일)이후 변경된 내용은 소비자상담실 (02-554-2639)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭 (<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→정보마당→의약품 등정보를 참조하세요.
- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

작성년월일: 2011년 02월 10일

- 제조자 : 청계제약(주)-경기도 화성시 양감면 대항리 1106-4
- 판매자 : (주)대웅생명과학-서울시 강동구 성내 1동 469-6