

세라비[®]

정

성 상

연한 갈색의 장방형 필름제피정

효능 · 효과

- 다음 경우의 비타민의 보급 : 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력저하시, 발육기, 노년기
- 눈의 건조감 완화, 야맹증
- 뼈 · 이의 발육불량, 구루병의 예방
- 철결핍성 빈혈의 예방 및 치료
- 아연의 보급

용법 · 용량

성인 및 12세 이상 어린이 1회 1정, 1일 1회 복용합니다.

성분 · 함량

1정 중

팔미틴산레티놀과립(KPC)..... 10.00mg (팔미틴산레티놀로서 5,000단위)	산화마그네슘(약전) 165.81mg (마그네슘으로서 100mg)
초산토코페롤 50%(KPC)..... 60.00mg (초산토코페롤로서 30단위)	산화제이동(KPC) 2.50mg (동으로서 2mg)
아스코르빈산 97%(별규)..... 309.28mg (아스코르빈산으로서 300mg)	염화크롬(USP) 0.128mg (크롬으로서 25μg)
엽산(약전) 0.40mg	몰리브덴산나트륨(KPC) 0.063mg (몰리브덴으로서 25μg)
질산치아민(약전) 9.29mg	셀레늄 함유 건조효모(KPC) 41.67mg (셀레늄으로서 22.5μg)
리보플라빈(약전) 8.50mg	황산망간(USP) 15.38mg (망간으로서 5mg)
니코틴산아미드(약전) 100.00mg	염화칼륨(약전) 76.27mg (칼륨으로서 40mg)
엽산피리독신(약전) 12.15mg	산화아연(약전) 18.67mg (아연으로서 15mg)
0.1%시아노코발라민(KPC) 30.00mg (시아노코발라민으로서 0.03mg)	제삼인산칼슘(BP) 440.49mg (총칼슘으로서 164mg)
에르고칼시페롤과립(KPC) 0.47mg (에르고칼시페롤로서 400단위)	
비오틴(USP) 0.045mg	
판토텐산칼슘(약전)..... 27.29mg	
요오드화칼륨(약전)..... 0.196mg	
푸마르산철(약전) 82.14mg (철로서 27mg)	

사용상의 주의사항

1. 경고

- 1) 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가능성 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 마십시오(비타민A 결핍증 환자는 제외).
- 2) 6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 과칼슘혈증 환자(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태), 유육정용, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 12개월 미만의 영아
- 4) 과칼륨혈증 환자
- 5) 월스씨병
- 6) 혈색소증(철대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 7) 신결석 환자
- 8) 중증의 신부전 환자
- 9) 임부

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오(복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오).

- 1) 1세 미만의 영아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피합니다.
- 4) 과수산뇨증 환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 5) 임부, 수유부
- 6) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
- 7) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 8) 신장애 환자
- 9) 저단백혈증 환자
- 10) 강심배당체를 투여 중인 환자

- 11) 당뇨병관련질환, 간질환 환자
- 13) 위장관 질환
- 15) 알칼리증, 소화성궤양

- 12) 담낭폐쇄, 구리 부족증 환자
- 14) 급, 만성 기관지염, 폐부종 환자
- 16) 당뇨병 환자

4. 부작용

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친피부, 통증성 관절부종, 위부불쾌감, 뉘은변, 설사, 변비, 발진, 발적, 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 두드러기, 광선과민증, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수, 상복부통증, 알레르기반응, 혈관부종, 관절통, 호산구증가, 요오드 중독증 등, 홍반, 부전수축, 중추신경계 기능저하, 요산과다혈증, 과칼륨혈증, 구역질, 가스참, 위장통증, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종, 어지러움, 얼굴·다리 종창
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량을 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 4) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 합니다.

6. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오.
가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
나) 레보도파
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

7. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

- 1) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경증 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 마십시오. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의를 하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울이십시오.
- 2) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 3) 임신·수유중 과량복용시 태아 및 영아의 갑상선기능장애 및 갑상선종을 유발할 수 있습니다.

8. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

저장방법

차광밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

포장단위

100정

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품은 소비자피해보상규정(재정경제부 고시)에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 본 제품에 대한 의문사항은 보령제약 소비자 상담실 수신자 부담전화 080-708-8088로 문의하십시오.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.

※ 이 첨부문서 작성일자(2006년 7월 11일)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boryung.co.kr 또는 소비자상담실 수신자 부담전화 080-708-8088에서 확인할 수 있습니다.

110706

제조 및 판매

BORYUNG

보령제약주식회사

경기도 안산시 단원구 신길동 1122-3

www.boryung.co.kr