KGMP

일반의약품

HEALTHFUL LIFE BEAUTIFUL LIFE
MEDICA KOREA

이상적인 배합의 종합소화위장약

게스틴® 정

GASTIN Tab.

분류번호:232

®

저희 메디카코리아는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 아름다운 회사, 불우한 이웃과 장애인을 결코 소홀히 하지 않는 회사, 진정한 제약회사가 되고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약품 하나 하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디카코리아 임직원들의 열과 땀이 배어있습니다.

게스틴정은 위장질환의 증상을 신속히 개선시키고자 8종의 성분을 합리적으로 배합하여 소화 · 제산 · 위장운동촉진 · 진경 · 위점막수복작용을 갖는 신개념의 종합소화위장약입니다.

【성분 · 함량】 1정 중

메타규산알루민산마그네슘(건조물로서)(식약청고시) ·····40mg
(산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로서 5.08mg)
탄산수소나트륨(약전) ·····50mg
비오디아스타제2000 Ⅳ(식약청고시) ·····20mg
스코폴리아엑스(약전) ·····5mg
(총알칼로이드(히요스시아민 및 스코폴라민으로서)로 0.045mg)
리파제 Ⅱ(식약청고시) ·····7.5mg
감초가루(약전) ·····25mg
(글리시리진산으로서 0.625mg)
침강탄산칼슘(약전) ·····100mg
말레인산트리메부틴(식약청고시) ·····50mg

【성　　상】 흰색의 원형 당의정

【약리작용 및 특징】

1. 소화촉진작용
   소화효소인 비오디아스타제 2000Ⅳ, 리파제Ⅱ를 함유하고 있어 소화흡수를 촉진합니다.
2. 제산작용
   3종의 제산성분(메타규산알루민산마그네슘, 탄산수소나트륨, 침강탄산칼슘)이 들어있어 위내의 산을 빠르게 중화시킵니다.
3. 위장운동촉진작용
   말레인산트리메부틴을 통해 약해진 위장의 운동을 촉진합니다. 즉, 위장관의 경련을 완화시키고 운동성을 정상화시킵니다.
4. 진경작용
   스코폴리아엑스의 진경작용으로 위산분비를 억제하고 위통 및 위경련을 치료합니다.
5. 위점막수복작용
   감초가루의 위점막수복작용을 통해 위점막손상으로 인한 소화성 궤양 증상을 완화시켜줍니다.

【효능 · 효과】

소화성 궤양에 따른 다음 증상의 개선 : 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량

【용법 · 용량】 성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 투석요법을 받고 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움등)을 일으킨 일이 있는 환자
   2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
   3) 신장애 환자
   4) 간장애 환자
   5) 의사의 치료를 받고 있는 환자

6) 인산염 저하가 있는 환자

3. 부작용

1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계, 졸음, 현훈, 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
4) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
5) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법, 용량을 지키십시오.
2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

5. 상호작용

위장진통, 진경제와 병용 투여하지 마십시오.

6. 소아 · 임부에 대한 투여

1) 이 약은 소아(15세미만)에게는 투여하지 마십시오.
2) 임산부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 마십시오.

7. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않은 곳에 보관하십시오.
2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

8. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
3) 부종이 있는 환자
4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

9. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.
2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.

10. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의하십시오.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계이뇨제(트리콜로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관.

【포장단위】 자사포장단위

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질 · 훼손된 제품은 구입경로를 통하여 교환해 드립니다.

※메디카코리아 홈페이지(www.medicakorea.com)를 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 본사 개발부((02)842-4760)로 문의바랍니다.

개정일자 : 2004. 7. 24
MK0407084

(주)메디카 코리아
경기도 화성시 향남면 상신리 904-6