일반의약품

분류번호234

알루벡정 (정)

ALUBEC Tablets

■ **원료약품의 분량** : 1정 중

건조수산화 알루미늄겔(약 전) ·····250mg

탄산마그네슘(약 전) ·····160mg

■ **성　　상**

백색의 원형 정제

■ **효능 · 효과**

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림

■ **용법 · 용량**

성인 1회 3정, 1일 3회 식후에 복용하십시오.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   투석요법을 받고 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 신장애 환자
   2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
3. 부작용
   이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
   1) 정해진 용법?용량을 잘 시키십시오.
   2) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의를 하십시오.
   3) 장기연용을 하지 마십시오.
   4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용 전에 의사 또는 약사와 상의를 하십시오.
5. 소아에 대한 투여
   이 약은 7세 이하의 영?유아에게 투여하지 마십시오.
6. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

■ **저장방법** 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과 되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

소비자상담실 : 080-611-8690(수신자부담)

제조발매원

주식회사 동구제약

본사:서울특별시 구로구 고척2동 195-2

공장:경기도 화성시 향남면 상신리 901-3

www.dongkoo.co.kr

설명서 작성일:

2004년 7월 2일