

콧물, 코막힘, 발열, 두통에

미나콜 캡슐

MINACOL Cap.

일반 의약품
분류번호:114

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

미나콜 캡슐은 해열·진통 작용을 갖는 아세트아미노펜과 콧물제거제인 염산슈도에페드린, 항히스타민제인 말레인산클로르페니라민이 복합처방되어 종합감기에 탁월한 효과를 보입니다.

● 원료약품의 분량 : 1캡슐중

아세트아미노펜(약전).....	200mg
말레인산클로르페니라민(약전).....	1.25mg
염산슈도에페드린(유.에스.피).....	15mg

● 성 상 : 백색의 분말이 충전된 상단 연청색, 하단 백색의 불투명 경질캡슐제

● 약리작용 및 특징점

1. 해열·진통 작용

시상 하부의 체온조절 중추에 작용하여 말초혈관을 확장시키고 피부혈류를 증가시켜 해열작용을 나타내며, 중추신경계에서 prostaglandin의 합성저해와 통증충격전달을 차단시키는 말초작용으로 확실한 진통효과를 나타냅니다.

2. 항히스타민 작용

부작용이 적은 항히스타민제로서 호흡기내의 분비물 분비억제작용으로 재채기, 콧물, 눈물이 나는 증상을 완화시켜 감기의 악화를 방지합니다.

3. 염산슈도에페드린의 작용

호흡기 점막의 α -수용체에 대한 직접적인 흥분 작용으로 혈관수축을 일으키며, β -수용체를 자극하여 기관지 이완 작용을 나타냅니다. 따라서, 감기, 상기도 알러지, 부비동염으로 인한 비출혈의 일시적 증상 완화와 비강, 부비동 배액(drainage)을 촉진합니다.

● 효능·효과

감기의 제증상 (콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

● 용법·용량

성인 : 1회 2캡슐, 1일 3회 식후 30분 복용한다.

어린이(8~14세) : 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

C레모나

경남제약주식회사

충남 아산시 신창면 읍내리 80-24

첨부문서 작성일자
2006. 7. 19

● 사용상의 주의사항

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상 (발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심이 되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 신장, 갑상선 질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

3. 복용할 때는 다음 사항을 주의할 것

- 1) 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 다음 약물과는 동시에 복용하지 말 것
진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것
- 4) 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.

4. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 3) 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 4) 장기 연용하지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

● 사용기간 : 제조일로부터 36개월

● 저장방법 : 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

● 포장단위 : 10, 100캡슐

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 학술부로 문의하시기 바랍니다.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 병·의원, 약국 및 도매상을 통하여 교환해 드리며, 재정경제부고시 “소비자 피해 보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다. (문의 전화 : 031-260-9161, 학술부)

【최신 정보 확인 방법】

이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.kyungnampharm.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.