

기침엔

프리비투스현탁액

(펜디조산 레보클로페라스틴)

분류번호 222 (진해거담제)

일반의약품 [조제용]

Privituss Suspension

500mL

제조판매원

Daewon 대원제약주식회사

본사 : 서울특별시 광진구 군자동 467-24

공장 : 경기도 화성시 향남읍 상신리 903-1

원료 및 기술제공

ÆSCULAPIUS
FARMACEUTICI

| 성분 함량 : 이 약 100mL 중
주성분 : 펜디조산 레보클로페라스틴(별규)
..... 708mg
(염산클로페라스틴으로서 400mg)
보존제 : 파라옥시벤조산프로필(KP)..... 13mg
보존제 : 파라옥시벤조산메틸(KP)..... 87mg

| 성상 : 불투명한 백색의 병 또는 알루미늄호일에 들어 있는 백색의 감미와 바나나 향이 있는 현탁액

| 효능 · 효과 : 기침의 완화

| 용법 · 용량 :

- 성인 : 1일 3회 1회 5mL 복용
 - 2~4세 : 1일 2회 1회 2mL 복용
 - 4~7세 : 1일 2회 1회 3mL 복용
 - 7~15세 : 1일 2회 1회 5mL 복용
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

잘 흔들어서 복용하십시오.

| 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 않습니다. : 이 약의 성분에 과민반응이 있는 환자
2. 부작용 1) 정신신경계 : 때때로 졸음 등이 나타날 수 있습니다. 2) 소화기계 : 때때로 구역, 구갈, 식욕부진 등이 나타날 수 있습니다. 3. 상호작용 1) 이 약은 중추신경계를 억제하거나 흥분시키는 약물에 상호 작용을 일으킬 수 있습니다. 2) 항히스타민제, 항세로토닌 약물의 작용을 증가시킬 수 있습니다. 3) 파파베린

같은 근이완제의 작용을 약화시킬 수 있습니다. 4. 임부 및 수유부에 대한 투여 일반적으로 임신중에는 사용하지 않습니다. (임신중임 동물에 대해 주로 수행된 시험은 초기형성, 태자독성에 초점이 맞추어져 있지 않습니다. 임신 첫달에는 이 약을 복용하지 않는 것이 바람직하고 임신 후기에는 의사의 지시에 의해 필요시 복용합니다.) 5. 소아에 대한 투여 : 0-2세의 영아에 대한 연구가 불충분하므로 영아에 이 약을 사용하는 것은 바람직하지 않습니다. 6. 고령자에 대한 투여 : 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다. 7. 과량투여시의 처치 : 과다복용시, 일반적인 처치(위세척, 활성탄투여 등)를 행하고 과흥분의 징후를 체크합니다. 8. 적용상의 주의 : 흔들어서 사용합니다.

| 저장방법 : 기밀용기, 실온보관 (1-30℃)

※ 본 의약품은 KGMPI(우수약품제조관리기준) 적합체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 유효기간 또는 사용기한(유효기간과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewonpharm.co.kr)나 전화(080-497-8272)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드릭(ezdrug.kids.go.kr) 의약품 정보를 참조하세요. • 작성일자 : 2008. 03. 03