

카스 룡정

[사용상의 주의사항]

일반의약품 / 분류번호 : 234

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 투석요법을 받고 있는 환자. 2) 다음 질환으로 치료 받고 있는 환자. 혈액질환, 신장·간장의 질환, 위·십이지장의 질환, 천식·류마티스등 면역계질환 (때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다. 위·십이지장 질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있다.) 3) 다음 약물을 투여 받고 있는 환자. 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아즐게 항진균제 (때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다. 위·십이지장 질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있다.) 4) 적혈구 감소증, 혈소판 감소증, 백혈구 감소증 등의 혈액이상의 병력이 있는 환자 (혈구수의 감소가 중가될 수 있다.) 5) 히스타민 H₂수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 사람 6) 소아 (15세 미만) 및 고령자(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며 (사용 경험이 적다), 80세 이상의 고령자에서는 신기능 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현될 수 있다. 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유 중 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의한다. 2. 일반적 주의. 1) 장기연용을 하지 않는다. 2) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다. 3) 3일간 복용해도 증상 개선이 보여지지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것. 4) 2주일을 초과하여 연용하지 말 것. 5) 본 제를 복용할 시에는 알코올음료는 섭취하지 말 것(혈중 알코올농도를 높일 수 있음) 6) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것. 7) 기재된 효능 이외의 증상에는 복용하지 말 것. 3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 약제를 복용 중인 환자. 약물 상호작용에 의해 부작용의 발현 및 효과의 감소가 나타날 수 있다. 2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람 3) 고령자(65세 이상) 80세 미만의 고령자에서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여한다. 4) 인후통, 기침 및 고열이 있는 환자. 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소 등의 혈액 이상이 인정될 수 있다. 이러한 증상은 본 제의 복용에 의해 증상이 악화되거나 본 제의 부작용을 은폐시킬 수 있다. 5) 원인 불명의 체중 감소가 있는 환자. 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다. 6) 복통이 지속되는 환자. 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다. 4. 부작용. 본 제의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현될 수 있다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것. 1) 알레르기 증상(발진·발적, 가려움, 부종), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(염산라니티딘의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있다.) 2) 본 제의 복용 후 즉시 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워 지며, 식은 땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우 3) 고열을 수반한 발진, 발적, 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우 4) 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안쪽이 하얗게 변함, 출혈이 쉽게 됨 (치경의 출혈, 비출혈이 나타나는 경우) 5) 황달 5. 상호작용. 1) 본 제에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있다. 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등)·뉴-퀴놀론계항균제(오플록사신 등) 2) 본 제를 다른 위장약과 병용하지 말 것. 다른 위장약을 동시에 병용하면 작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있다. 6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부. 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유 중으로 이행되므로 수유부에 투여 할 경우에는 수유하지 않도록 주의한다. 7. 소아에 대한 투여. 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다. (사용 경험이 적다) 8. 고령자에 대한 투여(65세 이상) 80세 미만의 고령자에서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여한다. 9. 저장상의 주의사항. 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선이나 고온인 장소를 피하고, 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

한신 카스 룡^정

【원료약품 및 그분량】 1정(370mg)중.

염산라니티딘(USP24) 31.5mg
산화마그네슘(약전) 50.0mg
규산알루미늄산마그네슘(식품의약품안전청고시 제98-127호)
..... 125.0mg
수산화알루미늄산마그네슘(식품의약품안전청고시 제2000-14호)
..... 100.0mg

【성 상】 백색의 원형 필름코팅정.

【효능/효과】 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관.

【용법/용량】 성인(15세이상~80세미만): 1회 2정씩 복용
하되 복용 후 5시간 이상 경과해도 증상이 완화되지 않으면
다시 2정을 복용한다. 단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 한다.

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기
간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여
교환하여 드립니다.

08052004

제조번호 :

사용기한 :

