

일반의약품
분류번호: 234

에스케이 라틴 정

SK 케미칼
Life Science Biz.

※ [원료약품 및 그 분량] 1정 중

· 유효성분 : 라니티딘염산염(LSP).....	31.5mg
(라니티딘으로서 28.227mg)	
· 신화마그네슘(KP).....	50mg
· 구산알루미늄산마그네슘(MF).....	125mg
· 수산화알루미늄산마그네슘(KP).....	100mg
· 첨가제(타르색소) : 황색4호 알루미늄레이크	
· 기타 첨가제 : 마겔링셀룰로오스102, 저지환도히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산마그네슘, 탈크, 히프록셀로스2910, 산화티탄	

※ [성상] 황색의 원형 필름코팅정제

[효능·효과] 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

[용법·용량] 성인(15세 이상, 80세 미만) : 1회 2정씩 복용하되 복용 후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정씩 복용하십시오. 단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록 하십시오.

※ [사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 다음 질환으로 치료받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장(콩팥)·간장질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스 등의 면역계질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 2) 다음 약물을 투여받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아플게 항진균제(때때로 백혈구감소나 혈소판감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 3) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상 병력이 있는 환자(혈구수의 감소가 증가될 수 있습니다.)
- 4) 히스타민 H₂-수용체 길항제(약제, 대항제)에 과민증의 병력이 있는 사람
- 5) 소아(15세 미만) 및 고령자(노인)(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적습니다.), 80세 이상의 고령자(노인)에게는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현(드러냄, 드러내 보임)될 수 있습니다.
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 하십시오.
- 7) 투석요법을 받고 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약제를 복용중인 환자 : 약물상호작용에 의해 이상반응의 발현(드러냄, 드러내 보임) 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.
- 2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
- 3) 고령자(노인)(65세 이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.
- 4) 인후(목구멍)통, 가림 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소 등의 혈액 이상이 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 이 약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 이상반응을 은폐시킬 수 있습니다.
- 5) 원인불명의 채증감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 6) 복통(배아픔)이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.
- 7) 이 약은 황색4호(타르색소)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 이상반응

이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현(드러냄, 드러내 보임)될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지럼, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(라니티딘염산염의 이상반응 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 이상반응을 일으키는 경우가 있습니다.)
- 2) 이 약의 복용후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우
- 3) 고열을 동반한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신파부, 입과 목의 정맥에 나타나는 경우
- 4) 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안색이 하얗게 변함, 출혈하기 쉽게 됨(지혈(지킴)의 출혈, 비출혈(코피) 등)이 나타나는 경우
- 5) 황달

4. 일반적 주의

- 1) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2) 2주간을 초과하여 연용(계속 사용)하지 마십시오.
- 3) 이 약을 복용할시에는 알콜음료는 섭취하지 마십시오(합중 알콜농도를 높일 수 있습니다.)
- 4) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 5) 기재된 효능 이외의 증상에는 복용하지 마십시오.
- 6) 장기 연용(계속 사용)을 하지 마십시오.
- 7) 신장(콩팥)병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

- 1) 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있습니다.
 - 테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등)
 - 뉴-퀴놀론계 항균제(오플록사신 등)
- 2) 이 약을 다른 위장약과 병용(함께 사용)하지 마십시오 : 다른 위장약을 동시에 병용(함께 사용)하면 작용이 강하게 발현(드러냄, 드러내 보임)되어 예기치 못한 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여한 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.
- 7) 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다.).
- 8) 고령자(노인)에 대한 투여(65세 이상)
80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.
- 9) 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선이나 고온을 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 직접용기에 별도 표기

※ [포장단위] 120정(10정/스트립 x 12)

[제조(의뢰자) 에스케이케미칼(주)] / 충청북도 청주시 흥덕구 신단로 149

※ [제조자] (주)넥스팜코리아 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 받은 제품입니다. 만약 구입시 변질·변태·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/sk)나 제품상담전화(080-021-3131)를 통해 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '온라인의약품도서관(<http://drug.meds.go.kr>)'을 참조하십시오.
- 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 개정일 : 2018. 07. 11
(Ver.008)

SK 케미칼
Life Science Biz.
에스케이케미칼(주)

제조자
넥스팜코리아
NEXPHARM KOREA

자세한 문의는 제품상담 전용전화로 이용하시기 바랍니다.
제품상담 전용전화(무로) : 080-021-3131