

일반약품

의약품 분류번호	238
	하제, 완장제

일반적으로 변비란 장에서 변이 장시간 머무르게 되어 수분량이 감소되고, 이로 인해 변변 횟수가 줄고 배변하기가 힘들며 배변후 잔변감을 느끼는 증상을 말한다. 비식물성은 대변을 연화시킬 뿐 아니라 장의 어동운동을 촉진시켜 변비를 개선시키는 시원하고 효과적인 변비 치료제입니다.

【위료약품 및 그분량】 1정 중

비타민 B ₆	4mg
카스테롤 (B) [*]	14mg
(카스카로시드류 (카스카로이드 A로서 환산된)로서 22mg)	
도큐세이트나트륨 (B) [*]	20mg
데히드로콜란 B ₆	30mg
첨가제 (타르색소) : 청색 1 호알루미늄레이크 황색 4호알루미늄레이크 황색 5호알루미늄레이크	

【성상】

지하 노새의 피르코팅정제

【악리작용 및 특징】

1 장 여동우동 출처

비시쿨정은 장관활근 및 장관벽내 신경총 (enteric neural plexus) 을 직접적으로 자극하여 장의 운동능동을 촉진합니다.

2 시원한 배변유도, 부드러운 대변유도

비식물성은 위·장관 분비를 촉진시키고 단단하게 굳어있는 대변 내로의 수분 투과성을 증대시킴으로써 대변을 연화시켜 시원하고 부드러운 배변을 유도합니다.

3. 생약 및 양약성분의 호기적인 배합을 통한 변비치료제

비시쿨정은 배변을 유도하고 대변을 연화시키는 생약 및 양약 성분이 이상적으로 배합되어 변비 및 변비에 의한 증상을 완화시키는 효과적인 변비치료제입니다.

【형·화】

- 66 -

- 번에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진 (식욕기피), 복부(배)부종, 장내 이상발효, 치질

【요법·요량】

-성인(15세이상)의 일 1회, 1 회 1~3정 취침전에 복용한다

- 소아(11~14세) 1일 1회, 1 회 1~2정을 취침전에 복용한다.

다만, 화하는 최소량을 복용하고, 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

【사용상 주의사항】

1. 다음 흔지에는 투여하지 말것

1) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성 (galactose intolerance) Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorbtion) 등의 유전적이지 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 사람은 복음전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

1) 심한 복통 또는 구역, 구토가 있는 사람

2 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람

3) 다른 약물을 투여받고 있는 사람

4) 이 약은 항색 4호 알루미늄레이크를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 사람

3. 복용할 때 다음 사항에 주의하십시오.

1) **징해진 용법·용량을 잘 지키십시오.**

2 소아에 복용시킬 때에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.

3) 이 약은 7세이하의 유·소아에게 복용시키지 마십시오.

4. 복요중 또는 복요후는 다음 사항에 주의하십시오.

1) 이 약을 복용함으로써 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사의 상담을 받으십시오.

2) 자극성 완하제는 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안됩니다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사해야 합니다.

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 (습기가 적은) 서늘한 곳에 (뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 실온 (1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】

자사포장단위

【제품문의처】

한미약품 (주) 소비자상담실 :080-9169000 (수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 약거 보상받을 수 있습니다 (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

8 801121 002896

Ver.00289003

※ 주의

1. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
2. 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재 (용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 :2009.10.20

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 방이동 45

(공장)경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지
(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.