

치은염 · 치조농루 치료제

덴 큐 린 캡슐

DENCURINE CAP.

건강한 치아를 유지하려면 치아를 지지하고 있는 잇몸, 치조골 등과 같은 치아 주위 조직의 관리가 무엇보다 중요합니다. 이러한 조직에 염증과 같은 질환이 생기면 잇몸이 붓고, 피가 나며, 통증이 생기는 등 각종 유해증상이 발생하게 됩니다.

덴큐린캡슐은 잇몸 등에 염증을 일으키는 원인인 잇몸 속 세균의 살균 및 손상된 잇몸조직의 재생촉진, 잇몸출혈을 방지하는 지혈작용 등을 갖춘 성분들이 골고루 함유되어 잇몸의 발적, 부기, 출혈, 통증 등과 같은 치주질환의 증상을 효과적으로 완하시켜 주는 복합잇몸질환치료제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

염화리소짐(KPC).....	30.0mg(약가)
아스코르빈산(KP).....	150mg
초산토코페롤 50%(KPC).....	10mg
(초산토코페롤로서 5mg)	
카르바조크롬(KPC).....	2mg

【성 상】 옅은 주황색 분말이 든 상하 초록색의 경질캡슐제

【효능 · 효과】

치은염, 치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적 · 부기 · 출혈 · 통증)의 완화

【용법 · 용량】 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 2) 약 및 화장품 등으로 알레르기증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람

2. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의합니다.
- 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막만증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진 · 발적, 화상상의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받습니다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.
- 2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의합니다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 대표전화 : (02)2672-1122 제품문의 : 080-655-1414

설명서 문안 개정년월일 : 2007. 8. 10

I-0701