

씹어먹는 멀미약

트라밍췌정

물없이 바로 씹어 드세요~

일반적으로 멀미는 오심, 구토, 두통을 동반하고 복강에서 위반강내의 장기로부터 구심성 자극이 부교감 신경 등을 경유하며, 구토 중추에 달하는 반사성 현상입니다. 이 경우 사용되는 약물은 진정제, 정신신경용제, 항히스타민제 등이 사용되는데 이들의 많은 약물 중에서 비교적 안전성이 높은 약물 3종을 선택 처방한 제제가 "트라밍췌정"입니다. 이 약은 약복용에 대한 부담감을 줄이고 물 없이도 어디서나 맛있게 씹어 먹을 수 있고 휴대에 편리하게 만든 우수한 약입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

브롬화수소산스코폴라민 (약전).....0.125mg
염산메클리진 (약전).....12.5mg
무수카페인 (약전).....10mg

【성 상】 분홍색 원형의 씹어먹는 정제

【효능 · 효과】 멀미에 의한 어지러움, 구토, 두통의 예방 및 완화

【용법 · 용량】 멀미의 예방에는 승차 30분에서 1시간전에 성인 1회 2정을 복용한다. 또 필요시 추가 복용할 경우에는 1회 2정을 4시간이상 간격을 두고 복용한다. 1일 복용 횟수는 2회를 한도로 한다. 씹어서 복용 할 것.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여 할 것.

- ① 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- ② 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 환자
- ③ 녹내장 (눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨장애 환자
- ④ 심장애 환자, 녹내장 (눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨장애 환자, 허약자 또는 고령자
- ⑤ 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

2. 부작용

- ① 이 약을 투여 함으로써 발진, 발적, 가려움, 심계항진 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 한다.
- ② 이 약을 투여함으로써 두통, 안면 홍조, 눈부심, 배뇨장애 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- ③ 이 약을 투여함으로써 구갈 또는 변비가 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의 사항

- ① 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.
- ② 소아에게 투여하지 않는다.
- ③ 이 약을 투여함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계 조작을 하지 않도록 주의한다.

4. 상호작용

다음 약물과 병용 투여하지 않는다. : 다른 진통제, 감기약, 해열 진통제, 항히스타민제, 진정제, 진해거담제, 위장진통, 진경제 등

5. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공 감미제 아스파탐은 체내에서 분해 되어 페닐알라닌으로 대사되므로 페닐알라닌의 섭취를 규제 할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.

● 1일 허용량 제한

아스파탐 함량을 WHO 권장량(40mg/kg/1일) 이하로 조정 (가능한 한 최소량 사용) 할 것. 60kg 성인 : 1일 최대 복용량 2.4g

7. 저장상의 주의사항

- ① 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- ② 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- ③ 오용을 피하고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 4정

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

개정년월일: 2003년 1월 24일

- 최신의 정보확인방법: 변경된 내용은 학술부(031-443-3921~3)에서 확인할 수 있음.



제조발매원

크라운제약(주)

경기도 안양시 만안구 안양7동 218-7

학술부: TEL(031)443-3922~3, (02)754-4271