



항산화 비타민 A, C, E 함유

안티진

연질
캡슐

우리 인체내의 반응성 활성산소(Active Oxygen)나 유리기(Free radical)는 정상적인 세포내 반응으로도 생성되거나 흡주나 스트레스, 대기오염 등으로 활성산소나 유리기가 적정량 이상이 되면 인체세포를 공격하게 되어 만성피로, 여러가지 질환, 노화 등의 원인이 되기도 합니다. 안티진 연질캡슐은 우리 몸에 꼭 필요한 셀레늄과 항산화비타민인 베타카로틴 A, C, E가 고단위로 함유되어 있어 유해활성산소에 의한 생체조직 손상을 예방해주며 알초혈행장애 및 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증, 색소침착 등의 경년기 증상을 완화시켜줍니다.

[원료약품 및 분량] 1캡슐(860mg) 중

셀레늄 0.1%(가루약).....	50mg
(셀레늄으로서 50μg)	
토코페롤아세이트(비타민E).....	200mg
(비타민으로서 200 IU)	
베타카로틴30%(연질캡슐).....	10mg
(베타카로틴으로서 3mg)	
아스코르브산(아스코르브산).....	250mg
산화아연(아연).....	9.337mg
(아연으로서 7.5mg)	
산화아연(아연).....	1252mg
(아연으로서 1.0mg)	
황산칼륨(KSP).....	4.613mg
(황산으로서 1.5mg)	
참가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호, 황색203호	

[성상]

적갈색의 내용물을 함유한 암녹색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과]

1. 다음 경우의 베타카로틴 A, E, C의 보급

- 육체피로
- 임신수유기
- 병중·병후의 체력저하
- 노년기

2. 이 약에 포함된 베타카로틴 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 알초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증

[용법·용량] 12세 이상 및 성인 1회, 1회 1캡슐씩 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고

임부에 베타카로틴(레티놀)을 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가능성이 있는 부인에는 베타카로틴 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 않습니다. (베타카로틴 A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아
- 3) 흡연자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오)

- 1) 1세 미만의 영아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 과산화노종환자(hyperoxaluria : 노종에 과량의 수산염이 배설되는 상태)

4) 임부, 수유부

5) 심장·순환기계 기능 장애환자

6) 신장에 환자

7) 저당혈증환자

4. 이상반응

1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.

- 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종
- 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적
- 상복부부종, 혼수
- 피부열, 땀·호흡기 약해, 발도 조금
- 위장관장애, 소화장애, 지혈불, 배부종

2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예전보다 잘라지거나 많이 많이 잘 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 베타카로틴을 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.

4) 장기간 고용량 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.

5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 유행성 심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

1) 장해전 용법·용량을 잘 지켜십시오.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.

3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

4) 이 약에 함유된 베타카로틴 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조용법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.

6. 상호작용

1) 항알도스테론제, 트리아테렌과 병용투여시 고칼혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오.

- 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용전투여는 피하십시오.

7. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

임부에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 베타카로틴 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증기가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 베타카로틴 A 결핍증치로에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 마십시오. 또한 베타카로틴 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식용 용량으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 베타카로틴 A 투여는 5,000 IU/일미만을 넘도록 하는 등 적절히 주의하십시오.

8. 임신감사차에의 영향 : 각종 요점시에는 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.

3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[포장단위] 90캡슐, 180캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(15~30℃)

[사용기한] 제조일로부터 24개월

본 약품들은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.

구입시 사용기간에 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
본 제품은 광경각위전환 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상합니다.

- 약품들을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 약품들과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2009년 4월) 이후 변경된 내용은 이자드렉스(www.sedung.kids.go.kr/kids2)에서 확인하십시오.
- 소비자 상담실 : 02-5500-0001
- 반송 및 교환실 : 02-551-5880

설명서 개정일 2009. 04

제조현



경기도 특성사업장 산정액 905-6

아펜피코리아(주)

경기도 고양시 일산구