

[illegible]

11. 공무원에 대한 투여
1) 공무원의 시험장제와 임상시험(항우울제 및 기분 보조제) 임상에 참가했던 약 6,000명의 환자 중에서 275명이 65세 이상이고 47명이 75세 이상이었다. 또한, 65세 이상의 노인 수백명이 부부끼리 일반진료와 결혼 임상시험(항우울제)에 함께 참가하였다. 안전성 또는 유효성에서 고령자와 젊은 환자 사이에 전반적인 차이는 없었고, 고령자보다 다른 임상결과에서 고령자와 젊은 환자 사이의 반응 및 내약성의 차이가 확인되지 않았으나 일부 부부 고령자에서 부부끼리에 대한 임상각

- 다 크게 다뤄볼까 해서 배워볼 수 있는
- 2) 사내에 어울리는 복장: 사내복은 직장인의 부르짖음이고 그 대사의 의의들이다. 특히 직장에서는 바지나 셔츠, 단복 및 반팔 셔츠만 다는 악덕들이다. 악덕들은 바지나 셔츠만 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다. 특히 직장에서는 바지나 셔츠만 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다.
- 3) 부르짖음은 간혹서 정답처럼 고쳐서 쓰인다. 특히 사내에서 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다. 특히 직장에서는 바지나 셔츠만 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다.
- 4) 사내에 어울리는 복장: 사내복은 직장인의 부르짖음이고 그 대사의 의의들이다. 특히 직장에서는 바지나 셔츠만 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다.
- 5) 부르짖음은 간혹서 정답처럼 고쳐서 쓰인다. 특히 사내에서 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다. 특히 직장에서는 바지나 셔츠만 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다.
- 6) 사내에 어울리는 복장: 사내복은 직장인의 부르짖음이고 그 대사의 의의들이다. 특히 직장에서는 바지나 셔츠만 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다.
- 7) 부르짖음은 간혹서 정답처럼 고쳐서 쓰인다. 특히 사내에서 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다. 특히 직장에서는 바지나 셔츠만 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다.
- 8) 사내에 어울리는 복장: 사내복은 직장인의 부르짖음이고 그 대사의 의의들이다. 특히 직장에서는 바지나 셔츠만 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다.
- 9) 부르짖음은 간혹서 정답처럼 고쳐서 쓰인다. 특히 사내에서 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다. 특히 직장에서는 바지나 셔츠만 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다.
- 10) 사내에 어울리는 복장: 사내복은 직장인의 부르짖음이고 그 대사의 의의들이다. 특히 직장에서는 바지나 셔츠만 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다.
- 11) 부르짖음은 간혹서 정답처럼 고쳐서 쓰인다. 특히 사내에서 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다. 특히 직장에서는 바지나 셔츠만 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다.
- 12) 부르짖음은 간혹서 정답처럼 고쳐서 쓰인다. 특히 사내에서 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다. 특히 직장에서는 바지나 셔츠만 다는 악덕들이고 그 대사의 의의들이다.

- 인 방법이 권장된다. 과광 후에 후 처음 48시간 동안은 EEG 모니터링 역시 권장되며, 구토 또는 경련의 징후가 있다. 활성탄을 투여할 수 있으나, 강제적 배설, 투석, 혈액제제 또는 교환 수혈을 부피로피는 과광투여시의 대처법으로 실한 경험은 없다. 부피로피에 대한 특별한 해독제로 알려진 것은 없다. 과광투여시의 대처에서, 다양한 약물

- 3) 이 학의 발달 위험이 공장과 관련이 있으므로 과량투여가 의심되면 입원을 고려해야 한다. 동적 실험에 기초했을 때 변종도이제된다는 정맥투여하거나 다른 보조적인 방법으로 적절한 발작을 치료하는 것이 권장된다.

13. 모친 길 위담양의 주모사당
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 물질 유지면에서 바람직하지 않
으므로 이를 주의할 것

- 1) 발암성: 랫드와 마우스에서 각각 최대 300, 150mg/kg/day의 평균용량으로 생
존기간 발암성 시험이 실시되었다. 이 용량은 mg/m² 를 기준으로 했을 때, 사람
의 최고 권장용량(MRHD)의 각각 약 7배와 2배이다. 수컷 랫드와 암수 마우스의
발암성 시험에서 이 약 및 대사생물 제논 나노셀리크스에 고농도 시험에 처한

- 건강용량을 투여했을 때보다 더 높았다. 암컷 컷에서 부코르피온의 노출량은 사람에서의 약 3배, 대사는 사람에서보다 더 높았다. 컷에게 100~300mg/kg/day(mg/m² 기준으로 MRHD의 약 2~7배)의 용량을 투여했을 때, 간과 혈액 중독성 병변이 증가하였으며, 이차적으로 간 효소가 유도될 수 있다. 더 낮은 용량에서 시험되지 않

- 있다. 이와 같은 병변이 간 신생물의 전구체임지에 대해서는 아직 밝혀지지 않았다. 마우스 시험에서는 유사한 간 병변이 관찰되지 않았으며, 간 및 다른 기관에서 악성 종양의 증가 또한 관찰되지 않았다.

- 또는 in vivo에서 DNA 손상을 유발하지 않았다. 부르르키온은 Ames 비테라아의 변이형성 시험에서 5종 중 2종에서 양성 반응(대조 돌연변이율의 2-3배)을 나타냈고, 랫드의 골수를 이용한 in vivo 세포 유전시험에서 염색체 미상 증가가 1/3 이상, 가열되었다.

- 3) 생식독성: 최대 300mg/kg/day를 컷에게 경구 투여한 생식독성 실험에서, 생식능력 이상의 증가는 나타나지 않았다.

- 포장단위 : 60정
- | |
|------------------------------|
| 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 한다. |
|------------------------------|

- TM=Trade Mark
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나

- 나 변질, 연화 또는 오손된 제품은 약국, 병의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
- 첨부분서 최종 개정 연월일 : 2010. 12. 28

- 기타 문의사항은 www.gskkorea.co.kr이나 아래 번호에서 확인할 수 있습니다.

- 제조의지자 : GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd., 1061 Mountain Highway,
Boronia, Victoria 3155, Australia
제 조 자 : Glaxo Wellcome Inc. 1011 Arendell Avenue, Zebulon, North
Carolina 27597, USA

- 수입판매원 : 글락소 스미스클라인
서울시 용산구 한강로 2가 191
학술정보(수신자 요금부담) : 080-901-4100
기타문의(대표전화) : 02-709-4114

- WEL001.17
-
- DW-11-10