

모든 감기에 효과적임

콜 가 캡슐

일반의약품
분류번호 : 114

Colga Capsule

감기는 다양한 원인에 의해 발병되며 콧물, 재채기, 고열, 두통, 인후통, 관절통, 근육통, 몸살, 기침 및 가래 등 다양한 증상이 복합적으로 나타납니다. 감기를 소홀히 다룰 경우, 기관지염, 폐렴 등의 합병증을 유발할 수 있어 초기에 치료하는 것이 무엇보다 중요합니다. 따라서, 감기로 인한 여러 증상들을 신속히 완화시키기 위해서는 단일성분보다 복합성분의 감기약이 효과적입니다.

콜가캡슐은 해열 및 진통작용으로 널리 사용되는 아세트아미노펜과 기관지 경련성 수축을 이완시켜주는 dl-염산메칠에페드린, 콧물, 재채기 등을 완화시켜 주는 말레인산 클로르페니라민, 감기로 인한 염증을 완화시켜주는 소염효소 성분인 세라티오펩티다제와 함께 면역력 저하로 인한 합병증을 억제하기 위한 비타민 B군이 복합 처방되어 있습니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐중

아세트아미노펜(약전)	200mg
말레인산클로르페니라민(약전)	1.25mg
염산클로르페라стин(제이. 피)	8mg
dl-염산메칠에페드린(약전)	8.75mg
무수카페인(약전)	20mg
세라티오펩티다제(식약청고시) (세라티오펩티다제로서 6600단위)	3.33mg
질산치아민(약전)	4mg
리보플라빈(약전)	2mg

【성 상】

얇은 황색의 과립 및 미황색의 장용성 과립의 혼합물이 들어있는 백색 캡슐제

【효능 · 효과】

감기의 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법 · 용량】

성인 1회 2캡슐, 어린이(7~14세)는 1회 1캡슐을 1일 3회 식후 30분에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람은 복용하지 마십시오.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예: 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주)
경기도 화성시 동탄면 영천리 555-2

무수의약품제조관리기준
KGMP 적격지정업체

설명서 작성일 030801

설명서 개정일 050101

2. 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영·유아 및 14세 이하의 어린이
 - 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
 - 6) 녹내장 (예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
 - 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
3. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
 - 1) 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오.
진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
 - 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시키십시오.
 - 4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.
4. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.
 - 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
 - 3) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 4) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - (1) 이 약의 복용후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - (2) 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양, 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - (3) 천식이 나타난 경우
 - 5) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
 - 6) 장기 연용하지 마십시오.
5. 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
6. 경 고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다.
이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온보관, 제조일로부터 36개월

[포장단위] 자사포장단위