



고단위 종합영양제 다보타민[®]큐정

일반의약품

분류번호 : 316 (혼합비타민제)

※ 용기 개봉 방법

뚜껑을 누른 상태로 화살표 방향으로 돌려 여십시오. 정제를 꺼낸 후에는 뚜껑을 꼭 닫아 주십시오.

개요 및 특징

비타민과 미네랄은 단백질 · 지방 · 탄수화물과 함께 5대 영양소로 알려져 있으며 소량으로 인체의 정상적인 대사, 성장 및 기능을 조절하는데 필수적인 영양소입니다.


다보타민큐정은 비타민과 미네랄이 골고루 함유되어 있어 허약체질, 영양불량, 피로 등에 비타민 및 무기질의 보급제로 사용되며, 성장기 어린이부터 노년기까지 온 가족이 함께 복용할 수 있는 고단위 종합영양제입니다.

성분 · 함량 1정 중

베타카로틴 20% 과립(별규) 9.0mg
(베타카로틴으로서 1.8mg)
에르고칼시페롤 과립(비타민D로서 150IU)(KPC) ... 0.177mg
토코페롤아세테이트 50%(KPC) 60.0mg
(비타민E로서 30IU)
아스코르브산 97%과립(별규) 92.8mg
(아스코르브산(비타민C)으로서 90mg)
폴산(엽산)(KP) 0.333mg
티아민질산염 3배산(KPC) 27.0mg
(티아민질산염(비타민 B1)으로서 9mg)
리보플라빈(비타민 B2)(USP) 9.0mg
피리독신염산염 97%과립(별규) 9.3mg
(피리독신염산염(비타민 B6)으로서 9mg)
니코틴아미드(KP) 13.2mg
판토텐산칼슘(비타민 B5)(KP) 32.6mg
시아노코발라민 1% (별규) 2.0mg
(시아노코발라민(비타민 B12)으로서 20 μ g)



비오틴1% (비오틴으로서 100 μ g)(별규) 10.0mg
요오드화칼륨(KP) 0.196mg
(요오드로서 150 μ g, 칼륨으로서 46 μ g)
푸마르산철(철로서 30mg)(KP) 91.3mg
산화마그네슘(마그네슘으로서 100mg)(KP) ... 165.8mg
산화제이동(동으로서 3mg)(KPC) 3.8mg
황산아연인수화물(아연으로서 15mg)(USP) ... 41.2mg
황산망간(망간으로서 7.5mg)(USP) 23.1mg
인산수소칼슘수화물(KP) 300.4mg
(칼슘으로서 70mg - 총칼슘으로서 72.74mg, 인으로서 54mg)
염화칼륨(KP) 15.3mg
(칼륨으로서 8mg - 총칼륨으로서 8.05mg)
셀레늄함유건조효모(KPC) 27.8mg
(셀레늄으로서 15 μ g)
몰리브덴함유건조효모(별규) 7.5mg
(몰리브덴으로서 15 μ g)
첨가제 (타르색소) : 적색 40호, 청색 2호

성상 적갈색의 타원형 제피정



효능 · 효과

· 다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급 : 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력저하시, 발육기, 노년기
· 철결핍성 빈혈의 예방 및 치료 · 아연의 보급



용법 · 용량 성인 및 12세 이상 어린이 : 1회 1정, 1일 1회 복용합니다.

사용상의 주의사항

1. 경고

- 임신한 여성이 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 I.U. 이상 복용하는 경우에는 선천성 기형을 일으킬 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가능성이 있는 여성은 비타민 A를 5,000 I.U./일 이상 복용하지 마십시오. (비타민 A 결핍증 환자는 제외)
- 철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.

2. 다음 환자는 복용하지 마십시오

- 과칼슘혈증(hypercalcemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 3) 12개월 미만의 영아 4) 과칼륨혈증환자 5) 월슨씨병
- 혈색소증(철대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈 7) 신결석 환자 8) 중증의 신부전 환자
- 임신한 여성 10) 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자. (이 약은 유당을 함유하고 있습니다.)

3. 다음 환자는 신중히 복용하십시오 (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오)

- 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이는 비타민D 또는 칼슘의 복용을 피합니다.
- 과수산노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 수유부 5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자 6) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 신장에 환자 8) 저단백혈증 환자 9) 강심배당체를 투여중인 환자 10) 담낭관련 질환, 간질환 환자
- 담낭폐쇄, 구리 부족증 환자 12) 위장관 질환 13) 급 · 만성 기관지염, 폐부종 환자 14) 알칼리증, 소화성 궤양

4. 부작용

- 이 약 복용에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
: 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친피부, 통증성 관절 부어오름, 설사, 배가 거북함, 변비, 발진, 발적, 묽은변, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 구역질, 피부발진, 두드러기, 햇빛 노출시 피부에 과민반응이 일어남, 배 · 위통증, 경련, 열, 혼수, 배 윗부분 통증, 알레르기반응, 혈관 부어오름, 관절통, 호산구증가, 요오드 중독증 등, 홍반, 부전수축, 중추신경계 기능저하, 요산과다혈증, 과칼륨혈증, 가스참, 위장통증, 피부염, 상복부통증, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 폐 부어오름
- 이 약의 복용에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 오랜 기간 높은 용량을 복용할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 엽산이 부족한 환자가 비타민 B12를 1일 10 μ g 이상 복용할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 높은 용량을 복용하면 소화성궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 많은 양의 복용으로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 율혈성심부전, 부어오름 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 오랜 기간 복용에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜 복용합니다.
- 어린이가 복용할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용할 수 있도록 하십시오.
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식사에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 I.U. 이상을 넘지 않도록 합니다.

6. 상호작용

- 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용할 경우 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
- 이 약을 복용할 경우에는 다음의 약물과 함께 복용하지 마십시오.
가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제 나) 레보도파
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 드시지 마십시오.


7. 임신한 여성 · 수유부, 미국아, 유아에 대한 투여

- 외국에서 임신 전 3개월부터 임신 초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 I.U./일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성은 비타민 A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 복용하지 마십시오. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한비타민 A투여는 5,000 I.U./일 미만에 머물도록 하는 등 적절한주의를 하십시오.
- 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 임신 · 수유 중 과량복용시 태아 및 영아의 갑상선기능장애 및 갑상선종을 유발할 수 있습니다.


8. 임상검사치에의 영향

- 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.


9. 저장상의 주의사항



1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



2) 직사광선을 피하고될수있으면습기가적고 서늘한곳에 뚜껑을잘닫아보관하십시오.



3) 잘못된 사용을 피하고, 품질을 보호 유지 하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

저장방법 실온(1~30℃)보관, 밀폐용기

본 제품은 습기가 많은 곳에서는 보관 중 인습되어 변색될 수 있으므로 정제를 꺼낸 후에는 뚜껑을 꼭 닫아주십시오. 병을 개봉한 후에는 가급적 빠른 시일 내에 복용하시기 바랍니다.

사용기한 외부 포장에 표기

포장단위 100정

※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되거나 파손된 제품일 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 설명서의 최근 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서개정일 2009. 11. 7

사용기한은 외부포장에 표기



제조판매원

유한양행

본사: 서울시 동작구 대방동 49-6
공장: 충북 청원군 오창읍 양창리 807-1

www.yuhan.co.kr
대표전화 : 02-828-0181

소비자상담실 : 080-024-1188
(수신자요금 부담)