

※ 이 의약품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

코막힘, 콧물, 인후통 증상에

일반의약품

코뚜[®]에프정

COTTU[®]-F Tablets

■ 성분 · 함량

1정 중

브로멜라인 (식품의약품안전청고시 제98-127호) 30mg

(브로멜라인으로서 15,000단위)

d-알레안산클로르페니라민 (약전) 1mg

■ 성 상

연청색의 장방형 필름코팅정제

■ 효능 · 효과

급성 비염, 알레르기성 비염 또는 부비강염에 의한 다음 증상의 완화 :

코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통(목구멍의 통증), 머리 무거움

■ 용법 · 용량

15세 이상 성인 : 1회 2정, 1일 3회 식후 복용

7세 이상 14세 미만 : 1회 1정, 1일 3회 식후 복용

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 염산페닐프로판올아민을 함유하는 다른 내복약(감기약, 비염용약, 진해거담약 등) 투여중인 환자
 - 이 약에 알레르기 증상의 병력이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 오줌누기 거북한 사람
 - 간장애 환자, 혈관응고이상(출혈경향)이 있는 환자
 - 지병이 있는 환자, 허약 체질인 사람 또는 고열 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 - 영·유아 및 고령자
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 부작용
 - 속(아니, 필락시) : 복용 후 곧바로 두드러기, 부종, 가슴쓰림 등과 동시에 안색창백, 수족냉감, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타날 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사의 진료를 받습니다.
 - 정신신경계 : 출혈성 뇌졸중을 일으킬 수 있습니다.
 - 소화기계 : 구역, 구토, 목마름, 변비, 입맛 없음이 나타날 수 있습니다.
 - 기타 : 발진, 발적, 오줌누기 거북함이 나타날 수 있습니다.
- 일반적 주의
 - 이 약의 투여에 의해 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전조작을 하지 않도록 주의합니다.
 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킵니다.
 - 수일간 복용하여도 증상의 나아짐이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여합니다.
 - 장기간 계속하여 투여하지 않습니다.

5. 상호작용

다른 비염용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해거담약, 진통제, 알레르기용약 등)과 함께 복용하지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 장소에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오용을 피하고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

■ 저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)에 보관합니다.

■ 사용기한

제조일로부터 36개월

■ 포장단위

10, 12, 50, 100정

■ 소비자상담

소비자보호실 전화 : 080-203-6000 (수신자 요금부담)

이메일 : pharm@kolon.com

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성일(2004년 8월 25일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지 (<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL: 080-203-6000) 에서 확인할 수 있습니다.

설명서 문안작성일 : 20031001

문안개정일 : 20040825

❖ 코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평동 48-5

<http://www.kolonpharm.co.kr>