

피부가려움, 피부염에

토비에스 크림

일반의약품

K G M P

적격업체

【성분 · 함량】 1g 중

디펜히드라민(KP)	10mg
di-칼파(KP)	20mg
ℓ-멘톨(KP)	30mg
에녹솔론(EP)	10mg
염산디부카인(KP)	5mg
파라옥시안식향산메틸(KP)	1mg
파라옥시안식향산프로필(KP)	1mg

【성상】 흰색의 크림제

【효능 · 효과】 발레올린데, 피부가려움, 습진, 두드러기, 피부염, 염피, 동창

【용법 · 용량】 1일 수회 환부에 적당량을 바른다

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 말 것.

- 1) 30개월 이하의 유아
- 2) 눈주위, 점막 등
- 3) 습진, 욕 등에 의한 피부염, 상처부위

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 지금까지 약물이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진 · 발적, 가려움, 욕 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 습윤이나 미란(진주름)이 심한 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 소아(경련을 유발할 수 있다)
- 6) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

이 약의 사용으로 인해 발진 · 발적, 가려움, 부종 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용한다.
- 3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.

5. 적응상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않는다.
- 2) 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻는다.
증상이 심할 경우에는 안과의사의 치료를 받는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 20g

※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 제품은 우수 의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

※ 본 제품 첨부문서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.arlico.co.kr)의 제품정보 또는 제품 문의처 전화(080-585-0004)를 통해 확인할 수 있습니다.

개정년월일 : 2008. 2. 20