

일반의약품	
의약품 분류번호	325

씨~클리어정

기미·주근깨·색소침착증 치료제

피부색이 검고 칙칙해지는 원인은 피부의 표피층에 있는 색소형성세포(멜라닌세포)에서 자외선, 여성호르몬 불균형, 정신적 스트레스 등으로 필요 이상의 멜라닌 색소가 과잉 생성되기 때문입니다.

동성제약의 **씨클리어정**은 강력한 항산화제로 산화된 멜라닌을 환원시키는 비타민 C와 멜라닌 합성효소인 tyrosinase를 억제하는 L-시스테인, 정상적인 상피기능에 필수적이며 비타민 B₅로도 불리우는 판토텐산칼슘의 복합제입니다.

씨클리어정은 과도한 멜라닌 색소의 침착을 방지하고 이미 침착된 멜라닌색소의 색을 얇게 하므로, 기미나 주근깨의 생성을 억제하여 피부의 미백에 도움을 줄 뿐만 아니라 습진, 여드름, 피부염의 증상을 개선시키고 피로를 회복시켜 줍니다.

씨클리어정의 약리작용

1. Inhibit Tyrosinase

씨클리어정은 멜라닌 합성을 위한 효소인 tyrosinase를 억제하여 멜라닌의 생성을 차단합니다.

2. Inhibit Peroxidase

씨클리어정은 멜라닌 합성의 효소인 peroxidase 또한 억제하여 멜라닌 생성의 차단효과가 더욱 강력합니다.

3. Antioxidant Effect

씨클리어정은 이미 형성된 산화형의 멜라닌을 환원시켜 새까만 색을 좀더 밝은 형태로 환원시킵니다.

4. Effect on Dermatitis

씨클리어정은 Carbohydrates, 지방산, 단백질, 당신생, Steroid hormones 및 Porphyrins의 대사에 중요한 Coenzyme A 구성성분의 하나인 판토텐산칼슘을 포함하여 피부염 등에도 적용할 수 있습니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

• L-시스테인(독일약전)	40.00mg
• 아스코르빈산 97%과립(별규)	51.55mg
(아스코르빈산으로서 50mg)	
• 판토텐산칼슘(약전)	4.00mg

[성상] 백색의 원형 당의정

[효능·효과]

기미, 주근깨, 햇볕에 탄 부위 등의 색소침착증, 습진, 여드름, 두드러기, 피부발진, 약물에 의한 피부염, 전신권태

[용법·용량]

성인(15세 이상) : 1회 2정씩 복용하십시오.
7세 이상~15세 미만 : 1회 1정씩 복용하십시오.
1일 3회 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약물을 복용하지 말 것.
중증 신장에 및 간성훈수 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
시스틴뇨증인 경우에는 신중히 투여할 것.
3. 다음과 같은 경우, 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 드물게 설사, 구갈, 가벼운 복통 등의 증상이 나타날 경우
2) 이 약의 복용에 따라 발진, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 경우
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법, 용량을 지킬 것.
2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것.(6세 이하의 어린이에게는 투여하지 않는다)
3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는, 약사와 상의할 것.
4) 이 약의 복용에 의해 뇨 및 대변검사가 영향을 받는 경우, 의사의 검사를 받을 때 비타민 C를 복용하고 있음을 의사에게 알릴 것.
5) 이 약을 물 묻은 손으로 만지지 말 것.(물 묻은 손으로 만질 경우 당의가 변색될 수 있다)
6) 병 속의 패킹은 수송 중에 정제의 파손을 방지하기 위한 것이므로 개봉 후에는 제거할 것.(병 포장 제품 중 패킹이 있는 경우에 한함)
5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 (습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀봉하여) 보관할 것.
3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
4) 사용기한이 경과된 제품은 복용하지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30°C)

[포장단위] 180정

첨부문서 최초 작성일 200309
첨부문서 개정일 200610

본 제품은 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자피해 보상 규정"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr)의 해당 제품정보란과 식품의약품안전청 의약품 정보 서비스(ezdrug.kfda.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

제조 및 판매원



동성제약주식회사

충남 아산시 둔포면 관대리 36-25

소비자상담전화: 080-001-0921

www.dongsung-pharm.co.kr