로알제리·토코페롤함유 종합영양제

알부그린 정 ALBUGREEN Tablets.

일반의약품
분류번호 : 398
KGMP 제품

알부그린정은 신비의 물질로 알려진 로얄제리와 토코페롤이 주제인 영양제로 비타민 C와 B_1·B_2·B_6·B_{12}및 니코틴산아미드 등의 비타민 B군이 배합된 종합영양제입니다. 특히 부형제로 영양이 풍부한 단백질을 함유한 건조난백(알부민)을 사용하였습니다.
알부그린정은 육체피로, 병중·병후, 임신·수유기, 노년기와 말초혈행장애와 갱년기에 좋습니다.

[원료약품의 분량] 1정 중

로얄제리 ····· (식약청고시) ····· 20.0mg
(10-히드록시-2데케노인산으로서 0.8mg)
건조초산토코페롤 50% ····· (별규) ····· 90.0mg
(초산토코페롤로서 45 I.U.)
제피아스코르빈산 ····· (식약청고시) ····· 104.0mg
(아스코르빈산으로서 100.0mg)
염산치아민 ····· (약전) ····· 5.0mg
리보플라빈 ····· (약전) ····· 2.0mg
염산피리독신 ····· (약전) ····· 5.0mg
0.1%시아노코발라민 ····· (식약청고시) ····· 12.0mg
(시아노코발라민으로서 12.0㎍)
니코틴산아미드 ····· (약전) ····· 40.0mg
건조난백분말 ····· (별규) ····· 200.0mg

[성 상] 적갈색 타원형 필름코팅정입니다.

[효능 및 효과]

- 말초혈행장해 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨, 목결림, 수족저림, 수족냉증
- 다음 경우의 비타민(B_1, B_2, B_6, C, E)의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기

(상기 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.)

[용법 및 용량]

성 인 : 1회 1정, 1일 3회 복용하십시오.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 3년

[포장단위] 120정, 240정

제조발매원
(주)청계pharma
CHUNG GEI PHARMA. Co., Ltd.
경기도 용인시 구성읍 마북리 382-3
제품문의 : 학술부 TEL : 02) 335-6860
홈페이지 : www.chunggei.co.kr

【사용상의 주의사항】

1. 경고

1) 로얄제리가 함유된 제제사용으로 인하여 천식 및 심각한 알레르기증상 등의 부작용이 나타났다는 외국의 보고가 있으므로 천식 및 알레르기 환자는 복용하지 마십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
2) 3개월 미만의 영아

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
3) 임부, 수유부

4. 부작용

1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의 하십시오 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B_{12}를 1일 10㎍ 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucos tolerance impairment:신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

5. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
3) 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용하십시오.

6. 상호작용

1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오. : 레보도파

7. 임상 검사치의 영향

1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.