

※ 사용 전에 첨부문서를 숙지 하시고 의약품과 함께 보관하십시오

일반의약품

분류번호 : 316

KGMP 적격업체

셀크칼 정

원료약품 및 그분량 (1정 중)

오소판물질(KPC).....	415.0mg
(칼슘으로서 75.5~102.1mg)	
• 기원 동물 : 소 • 사용부위 : 장골	
토코페롤 아세테이트 50% (KPC).....	100.0mg
(토코페롤 아세테이트로서 50U)	
티아민 질산염(KP).....	15.0mg
산화마그네슘(KP).....	20.0mg
(마그네슘으로서 12.06mg)	
리보플라빈부타레이트(KP).....	2.0mg
에르고칼시페롤과립 (KPC).....	0.118mg
(비타민D로서 100IU)	
셀레늄 함유간 조효모(KPC).....	23.2mg
(셀레늄으로서 12.5μg)	
첨가제(타르색소) : 황색4호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크	

성상

연 녹색의 타원형 필름코팅정

효능·효과

1. 뼈·미의 발육불량, 구루병의 예방
2. 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림, 냉증
3. 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 건통(어깨결림, 어깨통증) 등)
4. 각기
5. 칼슘 결핍 및 기타칼슘의 보급

용법·용량

12세 이상 및 성인 : 1회 2정, 1일 2회 복용

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), 락포 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
- 2) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
- 3) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 4) 12개월 미만의 영아(젖 먹이, 갓난아기)
- 5) 신결석 환자
- 6) 중증(심한증상)의 신부전 환자
- 7) 임부

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오(복용전 의사또는 약사와 상의하십시오)

- 1) 1세 미만의 영아(젖 먹이, 갓난아기)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
- 4) 임부, 수유부
- 5) 심장, 순환기계기능 장애 환자

- 6) 신장에 (신장장애) 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 감심배당체를 투여 중인 환자
- 9) 위장관질환
- 10) 알칼리증, 소화성 궤양
- 11) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

3. 부작용

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
(구역, 구토, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 뉘은면, 식욕부진, 복부(배 부분)팽만감, 저혈압, 얼굴열이오름, 심박동불규칙, 피부발진, 홍반(붉은반점), 부전수축(심장박동정지), 충추신경계 기능저하, 피부염, 땀 · 호흡시 약칙, 탈모, 조급증)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 5) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

- 1) 항일도스테로이드, 트리아멘테인과 병용(함께복용(사용))투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께복용(사용))투여하지 마십시오.
인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
- 3) 녹차, 홍차등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피하십시오.

6. 일부 · 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

- 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

7. 임상검사치에의 영향

- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 (뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용) · 남용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

100정, 200정

취급상의 주의사항

- ※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질 · 변패 또는 오염 및 손상된 제품이 발견된 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 작성일자 (2011년 05월 17일)이후 변경된 내용은 소비자 상담실 (02-554-2639)에서 확인 할 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭 (<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→정보마당→의약품정보를 참조하십시오.
- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

작성년월일 : 2011년 05월 17일

- 제조자 : 청계제약(주) - 경기도 화성시 양감면 대양리 1106-4
- 판매자 : (주)대웅생명과학 - 서울시 강동구 성내1동 469-6