※복용전에 첨부문서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

| 일반의약품 |
| --- |
| 분류번호:119 |
| KGMP제품 |

• 피로회복 • 정신적 · 신체적 기능무력증상에

# 빅포스액

Bigforce Soln.
(엘-아스파라긴산-엘-아르기닌)

빅포스액은 현대인의 내 · 외적 여러 환경에 따른 정신적 · 신체적으로 무기력해진 기능을 개선해주는 아미노산의 일종인 L-Arginine-L-Aspartate가 주성분입니다. L-Arginine-L-Aspartate 는 인체가 섭취한 탄수화물, 단백질(아미노산), 지방 등이 분해될 때 생기는 유기산을 호흡에 의해 완전히 산화시켜주고 에너지를 생성하는 Tricarboxylic acid cycle(TCA회로)에 관여하고 요소생성의 반응회로로서 간과 신장에서 아미노산 대사로 생성된 암모니아를 제거해주는 Ornithine cycle(Urea회로)에 관여하여 간독소를 제거하여 줌으로 피로와 집중력 장애를 일으키는 정신적 · 신체적 기능무력증상을 개선해 줍니다.
빅포스액은 바이알에 포장되어 복용이 편리하고 맛이 좋습니다.

**【원료약품의 분량】**
100m㎖ 중
L-아스파라긴산-L-아르기닌 (식약청고시) ····· 21.17g
파라옥시안식향산메칠 (약전) ····· 0.08g
파라옥시안식향산프로필 (약전) ····· 0.02g

**【성상】**
담갈색의 액제입니다.

**【효능 · 효과】**
정신적-신체적 무기력 증상(피로, 집중력 장애)
(상기 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다)

**【용법 · 용량】**
성인 : 1회 5㎖ 씩 1일 2-3회 식전에 소량의 물에 희석하여 복용하십시오.
3세 이상의 소아 : 1회 2.5㎖ 씩 1일 1~4회 식전에 소량의 물에 희석하여 복용하십시오.

**【사용상의 주의사항】**

**1. 경고**
이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.

**2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.**
중증의 간성 신부전증 환자

**3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.**
이 약은 카라멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

## 4. 일반적 주의

1) 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고
의사 또는 약사와 상의 하십시오.
2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

## 5. 상호작용

이 약은 항정신병약 및 수면제의 최면효과를 증가시킬 수 있습니다.

## 6. 적용상의 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시키십시오.

**【포장단위】**

15㎖ ×20병

**【저장방법 및 사용기간】**

차광기밀용기, 실온(1-30℃)보관, 제조일로부터 30개월

* 본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 첨부문서 작성일자 2004년 1월 이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실(02-335-6860)에서 확인할 수 있습니다.

제품설명서 작성년월일 2004년 2월

제조발매원
**정계제약주식회사**
경기도 용인시 구성읍 마북리 382-3
제품문의 : 학술부 TEL:02)335-6860
홈페이지 : www.chunggei.co.kr