

전문 의약품

비정형 정신분열증 치료제

리스펜 0.5mg, 1mg, 2mg, 3mg (Risperidone)

Rispen Tab.

분류번호 : 117(정신신경용제)

리스펜(Risperidone)은 평일제와 중앙인구소와 국내 벤처기업이 공동으로 원료합성기술을 개발하여 원료부터 완제품에 이르기까지 평일제약의 자체공정에 따라 생산되는 고품질의 정신질환 전문치료제입니다.

리스펜은 Benzisoxazole 유도체로서 중추신경계 세로토닌과 도파민 수용체 결합작용(SDA)을 통해, 운동기능 억제나 강경증과 같은 부작용의 발생은 최소화하면서 정신분열증의 양성증상과 음성증상 및 기타 정신질환의 증상 개선에 탁월한 효과가 입증된 항정신병 약물입니다.

【원료약품 및 그 용량】 1정중 리스페리돈(L.P.) 0.5, 1, 2, 3mg
침가제(타르색소) : • 2mg정 - 황색5호 알루미늄레이크
• 3mg정 - 황색10호 알루미늄레이크, 황색1호 알루미늄레이크, 황색5호 알루미늄레이크

【성상】
0.5mg: 적갈색의 장방형 필름코팅정제
1mg: 백색의 장방형 필름코팅정제
2mg: 연한 오렌지색의 장방형 필름코팅정제
3mg: 황색의 장방형 필름코팅정제

• 화학구조



• 화학식: 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazole-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one

【효능·효과】

- 다음 질환의 치료 및 유지 요법
 - 양성증상(환각, 망상, 사고장애, 체계적, 의식) 또는 음성증상(둔마른 정동, 감각적/사회적 위축, 대외활동)이 주로 나타나거나 급성, 만성 정신분열증 및 기타 정신질환 상태
- 정신분열증과 연관된 정동 장애(우울증, 외상, 불안)의 완화
- 공격성(언어적, 신체적, 유체적 자극), 활동장애(불안(흥분), 비행활동)와 같은 증상 또는 정신병 증상이 현저한 치매 환자의 행동 장애의 치료
- 양극성 장애와 관련된 조증의 치료를 위한 기분안정제의 부가요법제
- 파킨슨 병증(공격성, 충동성 및 자해적 행동)이 두드러지는 정신지체 또는 평균 이하의 지적 능력을 갖는 소아, 청소년 및 성인의 행성장애와 기타 파킨슨 병증증상의 치료

【용법·용량】

- 정신분열증
 - 1) 기존의 항정신병 약물로부터 이 약으로 전환하는 경우: 의학적으로 적당한 경우, 기존 제제의 용량을 서서히 줄이면서 이 약의 투여를 시작하도록 합니다. 또한 의학적으로 적당한 경우, 기존의 데로 항정신병 약물로부터 전환할 때에는 데로 제제의 예정된 다음 주사를 대신하여 이 약의 투여를 시작합니다. 병용중인 항파킨슨제의 투약을 지속할 필요가 있는지에 대해서는 정기적으로 재평가해야 합니다.
 - 2) 성인
 - ① 1일 용량 2mg(1mg씩 1일 2회)으로 투약을 시작하여 서서히 증량합니다. 유지량은 통상 1일 2~6mg을 원칙으로 1일 2회 분할 투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절하게 증감합니다.
 - ② 1일 용량 10mg(5mg씩 1일 2회) 이상 투여시 적응할 때까지에 비해 추가적인 효과에 관찰되지 않았고, 증세의 정도와 증상의 위험성을 증가시킬 수 있습니다. 1일 용량 10mg 이상은 개별 환자의 유익성과 위험성을 살펴보고 판단되는 경우에만 투여해야 합니다.
 - ③ 1일 용량 16mg(8mg씩 1일 2회) 이상 투여시의 안전성은 확립되어 있지 않으므로 투여해서는 안됩니다.
 - ④ 추가적인 진정효과가 필요한 경우, 벤조디아제핀계 약물을 병용투여할 수 있습니다.
 - ⑤ 노인: 초기용량으로 0.5mg씩 1일 2회 투여한 후 환자의 상태에 따라 1~2mg씩 1일 2회 투여가 될 때까지 0.5mg 1일 2회씩 증량합니다. 이 약은 노인에 대한 내약성이 좋습니다.
 - ⑥ 소아: 15세 미만의 소아에 대한 임상경험이 부족합니다.
 - ⑦ 간 및 신장질환자: 초기용량으로 0.5mg씩 1일 2회 투여한 후 환자의 상태에 따라 1~2mg 1일 2회 투여가 될 때까지 0.5mg 1일 2회씩 증량합니다. 이러한 환자들에 대한 더 많은 정보가 얻어질 때까지 신중히 투여해야 합니다.
- 치매 환자의 행동장애
 - ① 초기용량으로 0.25mg씩 1일 1회 투여합니다. 환자에 따라 필요한 경우 최소한 이들 간격으로 0.25mg 1일 2회씩 증량할 수 있습니다. 대부분의 환자에서 최적 용량은 0.5mg 1일 2회 투여 이지만 환자에 따라 1mg 1일 2회 투여까지 증량할 수 있습니다. 환자가 최적 용량에 도달 하면, 1일 1회 투여 요법도 고려할 수 있습니다.
- 양극성 조증 부가요법제
 - ① 초기 용량으로 1일 1회 2mg 투여를 권장합니다. 환자에 따라 최소한 이들 간격으로 1일 2mg까지를 증량할 수 있습니다. 대부분의 환자에서 최적용량은 1일 2~6mg 범위 내입니다.
- 행성장애와 기타 파킨식 행동장애
 - ① (체중 50kg 이상)
초기용량으로 0.5mg씩 1일 1회 투여를 권장합니다. 환자에 따라 필요한 경우 최소한 이들 간격으로 1일 0.5mg 증량할 수 있습니다. 대부분의 환자에서 최적 용량은 1mg 1일 1회 투여입니다. 환자에 따라 0.5mg 1일 1회 투여 또는 1.5mg 1일 1회 투여가 효과적일 수 있습니다. (체중 50kg 미만)
초기용량으로 0.25mg씩 1일 1회 투여를 권장합니다. 환자에 따라 필요한 경우 최소한 이들 간격으로 1일 0.25mg씩 증량할 수 있습니다. 대부분의 환자에서 최적 용량은 0.5mg 1일 1회 투여입니다. 환자에 따라 0.25mg 1일 1회 투여 또는 0.75mg 1일 1회 투여가 효과적일 수 있습니다. 5세 미만의 소아에 대한 임상 경험은 부족합니다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
 - ① 노인 치매 환자 : 이 약을 포함한 비정형 항정신병약의 17건의 대조 임상시험의 메타분석(meta analysis) 결과 비정형 항정신병약은 투여받은 노인 치매 환자의 사망률이 비매 투여받은 노인 치매 환자들에 비해 2배 높았으며, 노인 치매 환자에게 투여받은 이 약의 위약 대조 시험에서 사망률은 위약 투여 환자군에서 3.1%인데 비해 이 약 투여 환자군에서 4.0%였습니다. 사망한 환자의 평균 연령은 86세(67~100세 범위)였습니다. 이 약의 노인 치매 환자에 대한 위약 대조 시험 결과 리스페리돈 단독 치료군(31%, 평균 84세; 70~96세) 혹은 푸로페미드 단독 치료군(4.1%, 평균 80세; 67~90세)에 비해 푸로페미드(furosemide)와 리스페리돈 병용 치료군(7.3%, 평균 89세; 75~97세)에 투여한 사망률이 증가하였습니다. 리스페리돈과 푸로페미드 병용투여 환자에서의 사망률 증가는 4건의 임상 시험 중 2건에서 관찰되었습니다. 이러한 결과를 설명할 수 있는 기전은 명확히 확인되지 않았으며, 사망의 원에서 일관된 경향이 관찰되지 않았습니다. 그러므로 불구하고, 이의 같은 병용투여는 주의해야 하며 투여를 결정하기 전에 병용에 대한 위험성과 유익성을 고려해야 합니다. 다른 이뇨제를 리스페리돈과 병용투여할 환자에서는 사망률의 증가가 있었습니다. 치료 후 무관하게, 빈수는 사망에 대한 전반적인 위험요인이었으며 따라서 노인 치매 환자에게 탈수가 피지 않도록 주의해야 합니다.
 - ② 노인 치매 환자에 대한 위약 대조 시험에서 사망을 포함한 이상반응(뇌졸중, 일과성 허혈발작 등)이 위약 투여 환자군에 비해 이 약 투여 환자군에서 높은 빈도로 나타났습니다. (평균 85세: 73~97세)
- 위약에서의 관찰조사에서 정형 항정신병약도 비정형 항정신병약과 마찬가지로 사망률 상상을 관여한다는 보고가 있습니다.
- 정맥혈전증 위험 : 항정신병 약물 사용시 이상반응으로 정맥혈전증이 보고된 바 있습니다. 항정신병 약물을 투여 받은 환자들에게 정맥혈전증에 대한 후회적 위험요소가 자주 나타남에 따라 이 약을 사용할까 진과 사용하야 중에 정맥혈전증을 일으킬 수 있는 모든 위험요소를 확인해야 하며 예방 조치를 취해야 합니다.

- 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.
 - ① 이 약에 대한 과민증이 있는 환자
 - ② 알코올 또는 중추신경억제제로 인해 중추신경이 억제된 환자
 - ③ 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 고도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.
 - ① 심부전, 심근경색증, 전도이상, 탈수, 혈액량 감소증, 뇌혈관질환 등 심혈관계 질환자(α-수용체 차단 효과로, 특히 초기 용량 조절 단계에 기립성 저혈압이 나타날 수 있으므로 이러한 환자들에게는 신중히 투여해야 하며, 지시된 용법에 따라 서서히 용량을 증가 하도록 합니다. 시판 후 경험에서 이 약과 항고혈압제 병용시 임상적으로 유의한 저혈압이 관찰되었습니다. 또한 저혈압이 나타나면 용량 감소를 고려해야 합니다.
 - ② 간, 신장(기존의 정형약과 신장이완제들이 발작 에지를 낮추는 것으로 알려져 있으므로 간질환자에게는 신중히 투여합니다.
 - ③ 간, 신장질환자: 신기능 장애가 있는 환자는 정상 심인에 비해 활성 형태의 항정신병 약물을 배설하는 능력이 감소하며, 간기능 장애가 있는 환자는 유리 형태의 이 약의 혈장 농도가 상승합니다. 작용중에 관계없이, 신기능 장애 혹은 간기능 장애 환자에게는 초기 용량과 유지 용량을 절반으로 투여하고 용량 조절을 더욱 서서히 합니다. 이들 환자에게는 이 약을 투여하는 경우 주의합니다.
- 이상반응
 - ① 임상시험데이터
이 약의 안전성은 다양한 정신장애의 치료를 위하여 1회 이상 이 약을 투여 받은 972명의 환자(성인, 노인 치매 환자 및 소아)로부터 얻은 임상시험데이터를 통해 평가되었습니다. 이 972명의 환자 중 2636명의 환자는 이중맹검, 위약대조군 시험에 참여하여 이 약을 투여 받았습다. 이 약의 투여를 위한 조건 및 기간은 매우 다양하였습다(예, 이중맹검, 확증용량, 가변적용량, 위약 또는 활성 대조군 연구, 공개결정, 입원 및 외래 환자, 단기(12주 이하) 및 장기(3년 이하) 노출 등). 대부분의 이상반응은 경증 내지 중등도였습니다.
 - ② 이중맹검, 위약대조군 시험-성인 환자
8건의 3주 내지 8주의 이중맹검, 위약대조군 시험에서 1% 이상의 이 약 투여 성인 환자에서 보고된 이상반응을 아래 표 1에 나타냈습니다.
표 1. 이중맹검, 위약대조군 시험에서 이 약 투여 성인 환자 1%에서 보고된 이상반응

전신기/관계 이상반응	이 약 ≤ 8mg/day (N=853) %	이 약 > 8mg/day (N=198) %	위약 (N=687) %

감열 및 기생충 침입	21	40	17
코인두염	15	25	15
상기도 감염	07	15	06
부비동염	05	25	01
요로감염			
혈액 및 림프계 장애	0.1	1.0	0.1
빈혈			
면역계 장애	0.1	1.0	0.1
과민성			
정신 장애	162	253	132
불면증	77	111	44
불안	05	10	0.1
신경과민			
신경계 장애	193	172	79
파킨슨증	98	101	27
정좌불능증	68	15	20
운동장애	63	35	39
어지러움	46	30	13
진정	42	25	25
떨림	38	35	10
근육긴장이상 ^a	26	0	13
기면	12	0	0.1
체위성 어지러움	12	20	0.9
운동이상증	04	10	0
느린			
눈 장애	2.1	1.0	0.7
눈려보임			
귀 및 미로 장애	0.1	1.0	0.3
귀울음			
심 장애	1.1	2.5	0.1
빈맥			
혈관 장애	1.3	0.5	0.1
기립성 저혈압	02	1.0	0.3
저혈압			
호흡, 흉부 및 종격 장애	20	61	13
비흡증	08	20	0
호흡곤란	05	15	0.1
비흡증	05	10	0.6
부비동 충혈			
위장관 장애	6.4	4.0	2.6
구역	46	91	36
변비	43	61	26
소화불량	39	45	38
구토	23	05	19
심사	23	10	0.4
타액 과다분비	21	0	10
입안 건조	15	0	0
복부 불편감	11	10	0.7
복부 통증	11	10	0.6
위장 불편감	11	10	0.1
심박부동증	0.7		
피부 및 피하조직 장애	0.8	3.5	0.9
발진			
피부 건조	05	25	0.3
비듬	02	10	0
지루성 피부염	02	10	0
과화피독증	0	10	0.3
근골격 및 결합조직 장애	25	10	16
통풍증	15	25	06
관절염	12	10	22
팔다리 통증			
신장 및 비뇨기계 장애	0.2	1.0	0.3
요실금			
생식기계 및 유방 장애	0.4	1.0	0
사정 부전			
일반적 장애	23	10	10
피로	13	05	06
두통증	13	10	0.7
비명	08	15	0.4
흉부 통증			
조사			
혈액 크레아티닌 포스포크reatinine 상승	04	15	0.1
심박수 증가	02	15	0.1

^a 파킨슨증은 추체외로 장애, 근골격계 경직, 파킨슨증, 돌니바라식 경직, 운동불능증, 시음, 운동감소증, 기면, 얼굴, 근육 경직 및 파킨슨증을 포함합니다. 정좌불능증은 정좌불능증 및 안정불안증을 포함합니다. 근육긴장이상증은 근육긴장이상, 근육근육, 근육의 불수의적 수축, 근육 구축, 안구회전, 혀 바비를 포함합니다. 떨림은 떨림 및 파킨슨증의 안정 떨림을 포함합니다. 운동이상증은 운동이상증, 근육학, 무도병 및 무도무정위운동을 포함합니다.

3) 이중맹검, 위약대조군 시험-노령의 치매 환자
6건의 4주 내지 12주의 이중맹검, 위약대조군 시험에서 1% 이상의 이 약 투여 노령의 치매 환자에서 보고된 이상반응을 아래 표 2에 나타내었습니다(표 1에서 나타나지 않은 것과 표 1에서 2회 이상 나타난 것만을 포함).

표 2. 이중맹검, 위약대조군 시험에서 1% 이상의 이 약 투여 노령의 치매 환자에서 보고된 이상반응(표 1에서 나타나지 않은 것과 표 1에서 2회 이상 나타난 것만을 포함)

전신기/관계 이상반응	이 약 (N=1,009) %	위약 (N=712) %
감열 및 기생충 침입	129	103
요로감염	31	14
폐렴	11	23
면역장애		
대사 및 영양 장애	23	14
식욕감소		
정신장애	27	0.1
혼돈상태		
신경계장애	76	22
파킨	16	06
일시적 허혈성 발작	13	03
의식장애/저하	13	0
침울함	13	0
뇌혈관 사고		
눈장애		
결막염	27	1.1
혈관장애	22	14
저혈압		
호흡, 흉부 및 종격 장애	46	31
기침	15	08
코골음	16	13
위장관 장애	15	18
심부 불편	11	04
대변단단		
피부 및 피하조직 장애	40	46
홍반		
근골격계 및 결합조직 장애	18	08
이상 자세	15	03
관절 부기	13	0.8
일반적 장애	77	39
말초부종	40	18
발열	35	15
부형장애	15	03
오목부종		
조사		
체온상승	26	0.8

4) 이중 맹검, 위약대조군 시험-소아 환자
8건의 3주 내지 8주의 이중맹검, 위약대조군 시험에서 1% 이상의 이 약 투여 소아 환자에서 보고된 이상반응을 아래 표 3에 나타내었습니다(표 1에서 나타나지 않은 것과 표 1에서 2회 이상 나타난 것만을 포함).

표 3. 이중맹검, 위약대조군 시험에서 1% 이상의 이 약 투여 소아 환자에서 보고된 이상반응(표 1에서 나타나지 않은 것과 표 1에서 2회 이상 나타난 것만을 포함)

전신기/관계 이상반응	이 약 ≤ 3 mg/day (N=344) %	이 약 >3-6 mg/day (N=96) %	위약 (N=348) %

감열 및 기생충 침입	52	21	34
상기도 감염	35	11	32
비명	17	0	17
인플루엔자			
대사 및 영양 장애	172	32	72
식욕 증가			
정신 장애	17	0	0.9
혼돈 불연속	09	1.1	0
노곤함			
신경계 장애	26.5	15.8	7.7
통풍	22.4	21.1	14.9
두통	20.1	14.7	40
진정	8.1	13.7	2.3
어지러움	6.1	8.4	1.1
떨림	4.9	2.1	1.1
침울함	1.5	1.1	0
말초부종	0.9	1.1	0.6
위장 장애	0.9	1.1	0
과다 수면	0.6	1.1	0.9
심장애	0.6	2.1	0
두근거림			
호흡, 흉부 및 종격 장애	87	32	66
기침	49	21	34
통풍	38	42	17
비흡증	28	21	1.7
인두후부 통증	3.8	21	17
폐울혈	0.3	1.1	0.3
위장관 장애	137	84	92
구토	84	63	46
심박부 동증	67	21	60
심사	35	63	0.9
타액 과다분비	29	0	14
위장 불편감	23	2.1	0.6
복부 통증			
피부 및 피하조직 장애	12	0	0
가려움	09	1.1	0
아토피			
근골격 및 결합 조직 장애	12	1.1	0.9
통풍증	03	1.1	0.3
관절염			
신장 및 비뇨기계 장애	6.4	1.1	5.2
아노증	20	0	14
요실금	60	0	1.4
빈뇨증	15	1.1	0.3
생식기계 및 유방 장애	0.6	2.1	0
경부비대과			
일반적 장애	192	189	49
피로	84	32	63
발열	12	0	0
감정 이상	09	1.1	0
나태	03	1.1	0
흉부 불편감			
조사	49	21	09
혈액 포도당빈 상승	3.8	0	0.3

5) 기타 임상시험데이터
기타 임상시험, 위약대조군 시험에서 1% 미만의 이 약 투여 환자(성인, 소아 또는 노령의 치매 환자)에서 보고된 이상반응, 또는 이중맹검, 위약대조군 및 공개시험을 비롯한 기타 연구에서 이 약 투여 환자에서 보고된 이상반응을 아래 표 4에 나타내었습니다.

표 4. 이중맹검, 위약대조군 시험에서 1% 미만의 이 약 투여 환자(성인, 소아 또는 노령의 치매 환자)에서 보고된 이상반응, 또는 이중맹검, 위약대조군 및 공개시험을 비롯한 기타 연구에서 이 약 투여 환자에서 보고된 이상반응

신장 및 비뇨기계 장애			
아노증	6.4	1.1	5.2
요실금	20	0	14
빈뇨증	1.5	1.1	0.3
생식기계 및 유방 장애			
젖분비과다	0.6	2.1	0
일반의 장애			
피로	19.2	18.9	49
발열	8.4	3.2	6.3
감정 이상	1.2	0	0
나태	0.9	1.1	0
흥부 불쾌감	0.3	1.1	0
조식			
체중 증가	4.9	2.1	0.9
혈액 프로틴인 상승	3.8	0	0.3